

Über die Derivate
des
**Furfurans, Thiophens, Pyrrols
und Indols.**

Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doctorwürde
vorgelegt der
hohen philosophischen Fakultät
der
Universität Basel
von
Adolf Bender
Berlin.

Berlin 1889.
R. Gaertners Verlagsbuchhandlung
Hermann Heyfelder.
SW, Schönebergerstraße 26.

Einleitung.

In nachstehender Arbeit sind diejenigen Abkömmlinge eines hypothetischen Tetrolens C_4H_4 behandelt, in welchen die einfache Bindung zwischen zwei Methingruppen durch ein Sauerstoff-, ein Schwefelatom oder eine Imidgruppe hergestellt ist, also des Furfurans, des Thiophens, des Pyrrols und des Indols, des Phenylenpyrrols.

Eine hochlöbliche philosophische Fakultät der Universität Basel hat mit Rücksicht auf den grossen Umfang der ganzen ihr vorgelegten Arbeit gestattet, **dass nur der erste Teil derselben, die Monographie der Furfurangruppe, als Dissertation gedruckt wird.**



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41548826_0029

Vorbemerkungen.

Um die Verbindungen von analogem Verhalten und analoger Zusammensetzung einander möglichst nahe zu gruppieren, wurde folgende Reihenfolge eingehalten:

- A. Homologe resp. Kohlenwasserstoffderivate;
- B. Derivate mit Substituenten von elektronegativem Charakter;
- C. Derivate mit Substituenten von elektropositivem Charakter.

Die Reihenfolge der einzelnen Verbindungen in den verschiedenen Gruppen findet auf Grund folgender Regeln statt:

1. In Gruppe A entscheidet die Anzahl der Kohlenstoff-, in Gruppe C diejenige der Stickstoffatome die Reihenfolge. In Gruppe B folgen sich:
 - a) Halogene (Chlor, Brom, Jod, Cyan)
 - b) Nitroso-, Nitro-
 - c) Sulforyll-
 - d) CO-haltige Säureradical-
 - e) Hydroxyl- (incl. Carbonsäure)
 - f) Schwefelhaltige } Gruppen.
2. Der Substituent wird erst dann wiederholt resp. ein anderer für ihn eingesetzt, wenn alle Kombinationen mit den in der Reihe vorhergehenden Substituenten erschöpft sind.
3. Es ist gleichgültig, ob die Substitution im Kern oder in der Seitenkette stattfindet; nur rangieren letztere Verbindungen hinter ersteren.
4. Verbindungen, die kein selbständiges Interesse beanspruchen, sondern nur zur Charakteristik anderer dienen, schliessen sich direkt den bezüglichen Verbindungen an; als solche gelten: Salze, Ester, Phenylhydrazine, Oxime, Hydroverbindungen, z. T. Amide und Chloride.

Die Litteratur ist bis zum 1. Januar 1889 berücksichtigt.

Abkürzungen:

„H“	bedeutet	beim Erhitzen;
„K“	-	unter Abkühlung; fehlt „H“ und „K“, so ist „bei gewöhnlicher Temperatur“ zu ergänzen;
„Wss.“	-	Wasser;
„Alk.“	-	Alkohol;
„Äth.“	-	Äther;
„Salzs.“	-	Salzsäure; entsprechend bei anderen Säuren;
„lösl.“	-	löslich;
„Lös.“	-	Lösung;
„l.“	-	leicht;
„sch.“	-	schwer;
„n.“	-	nicht.

Hinter „Entstehung“ ist stets „durch Einwirkung von“ zu ergänzen.
A = Annalen der Chemie und Pharmacie; B = Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft; die übrigen Abkürzungen sind ohne Erklärung verständlich.


Litteraturnachweis.

1. Atterberg, B. 13 p. 879. — 2. Henninger, Bull. soc. chim. 35 p. 418; Compt. rend. 98 p. 149. — 3. Limpricht, B. 3 p. 90. — 4. Limpricht, A. 165 p. 253. — 5. Henninger, Bull. soc. chim. 41 p. 321. — 6. V. Meyer, B. 16 p. 1465. — 7. Henninger, Bull. soc. chim. 39. p. 625. — 8. Dietrich u. Paal, B. 20 p. 1077. — 9. Baeyer u. Tönnies, B. 10 p. 1364. — 10. Tönnies u. Staub, B. 14 p. 850. — 11. A. Hantzsch, B. 16 p. 1290. — 12. Paal, B. 14 p. 913. — 13. Paal, B. 14 p. 2756. — 14. G. Nuth, B. 20 p. 1333. — 15. E. Lang, B. 19 p. 2934. — 16. Hantsch, B. 19 p. 1336. — 17. A. Hantzsch u. E. Lang, B. 19 p. 1298. — 18. Hill u. Sanger, A. 231 p. 42 (B. 19 R. p. 241). — 19. Hill u. Hartshorn, B. 18 p. 448. — 20. Hill u. Sanger, B. 17 p. 1759. — 21. Hill, B. 16 p. 1130. — 22. Odernheimer, B. 16 p. 2988. — 23. Priebs, B. 18 p. 1362. — 24. Schmidt, B. 14 p. 1459. — 25. Claisen u. Ponder, A. 223 p. 144. — 26. E. Fischer, B. 13 p. 1334; A. 211 p. 214. — 27. Jourdan, B. 16 p. 658. — 28. Baeyer, B. 10 p. 355. — 29. Beilsteiner u. Schmelz, A. Suppl. III p. 275. — 30. Pawlinoff u. Wagner, B. 17 p. 1967. — 31. A. Hantzsch, B. 19 p. 2927. — 32. Voelkel, A. 86 p. 66. — 33. Guyard, Bull. soc. chim. 41. p. 289. — 34. V. Meyer, B. 11 p. 1870. — 35. Förster, B. 15 p. 322. — 36. Förster, B. 15 p. 230. — 37. Jorissen, B. 13 p. 2439. — 38. Voelkel, A. 85 p. 59. — 39. Hill, B. 10 p. 936. — 40. Williams, Chem. news 26 p. 231. 293. — 41. H. Müller, Chem. news 26 p. 247. — 42. Stenhouse, A. 130 p. 325. — 43. Babo, A. 85 p. 100. — 44. Stenhouse, A. 74 p. 278. — 45. Stenhouse, A. 35 p. 301. — 46. Fownes, A. 54 p. 52. — 47. Gudkow, Zschr. Chem. 1870 p. 360. — 48. Emmet, Silliman. J. 32 p. 140. — 49. H. Schiff, B. 20 p. 540. Gazz. chim. ital. XVII p. 329. — 50. Reis, A. Phys. (2) 13 p. 447. — 51. Stenhouse, A. 156 p. 197. — 52. Schiff, B. 10 p. 773. — 53. Schiff, B. 10 p. 1186. — 54. E. Fischer, B. 10 p. 1331. — 55. Schmidt, B. 13 p. 2342. — 56. Schwanert, A. 116 p. 257. — 57. Ramsay, J. chem. soc. 35 p. 696. — 58. Ramsay, J. chem. soc. 35 p. 463. — 59. Schiff u. Tassinari, B. 10. p. 1787. — 60. Stenhouse, A. 163 p. 185. — 61. Schmidt, B. 1881 p. 574. — 62. Scheele, Opusc. II p. 114. — 63. Trommsdorff, J. Pharm. 17 p. 159. — 64. Houton-Labillardiere, A. chim. phys. 9 p. 365. — 65. Pelouze, A. 9 p. 273. — 66. Boussingault, An. chim. phys. 58 p. 106. — 67. Stenhouse, J. pr. Chem. 32 p. 262. — 68. Malaguti, A. 25 p. 272. — 69. Malaguti, A. 32 p. 41. — 70. Arppe, A. 87 p. 238. — 71. Hirzel, Zschr. Chem. 1866 p. 246. — 72. Klinkhardt, J. pr. Chem. (2) 25 p. 41. — 73. Bennet u. Hill, B. 12 p. 655. — 74. Tönnies, B. 11 p. 1085. — 75. Wallach, B. 14 p. 751. — 76. Schiff u. Tassinari, Gazz. chim. ital. 8 p. 297; B. 11 p. 842. 1840. — 77. Liés-Bodart, A. 100 p. 327. — 78. Ciamician u. Denn-


stedt, B. 14 p. 1058. — 79. Heinzelmann, A. 193 p. 184; B. 9 p. 1198. — 80. Seelig, B. 12 p. 1081. — 81. Klinkhardt, J. pr. Chem. (2) 25 p. 41. — 82. Wislicenus u. Stadnicki, A. 146 p. 306. — 83. Harrow, Chem. soc. J. 33 p. 425; A. 201 p. 141. — 84. Bötttinger, A. 172 p. 239. — 85. Bötttinger, B. 8 p. 957. — 86. Bötttinger, B. 13 p. 1969. — 87. Paal, B. 18 p. 58. — 88. Baeyer, B. 10 p. 695. — 89. Baeyer, B. 10 p. 1358. — 90. Conrad u. Bischoff, A. 204 p. 201. — 91. Tönnies, B. 12 p. 1200. — 92. Hantzsch u. Pfeiffer, B. 19 p. 1301. — 93. Tönnies, B. 12 p. 1202. — 94. Hill u. Palmer, B. 18 p. 2095. — 95. Knorr, B. 17 p. 2863. — 96. Baeyer u. Perkin, B. 17 p. 59. — 97. Cahours, A. 69 p. 82. — 98. Schiff, A. 239 p. 349. — 99. Schiff, B. 19 p. 2153. — 100. Schwanert, A. 134 p. 61. — 101. Bertagnini, A. 88 p. 127. — 102. Japp u. Hooker, B. 17 p. 2410. — 103. Bahrmann, J. p. Chem. (2) 27 p. 295; Inaug.-Diss. Rostock 1883. — 104. Dauber, A. 74 p. 204. — 105. Radziszewski, B. 10 p. 321. — 106. Davidson, Pharm. Centr.-Bl. 1855 p. 851. — 107. Bacchetti, Jahresber. 1855 p. 561. — 108. Bödeker, A. 71 p. 62. — 109. Miller, A. 74 p. 293. — 110. Svanberg u. Bergstrand, J. pr. Chem. 66 p. 229. — 111. How, Pharm. Centr.-Bl. 1855 p. 95. — 112. Karmrodt, A. 81 p. 164. — 113. Ramsay, B. 11 p. 1836. — 114. Schiff, B. 11 p. 1250. — 115. Ciamician u. Dennstedt, B. 14 p. 1475. — 116. Ladenburg u. Engelbrecht, B. 11 p. 1655. — 117. Ladenburg, B. 11 p. 595. — 118. Schiff, A. 201 p. 355. — 119. Japp u. Wilcock, Chem. Soc. J. 39 p. 225. — 120. Cornelius u. Homolka, B. 19 p. 2239. — 121. Paal, B. 20 p. 1074. — 122. Schiff, B. 19 p. 847, s. a. No. 125. — 123. Oliveri u. Canzoneri, B. 20 R. p. 220. — 124. Baeyer, B. 5 p. 26. — 125. Hantzsch, B. 19 p. 1336. — 126. Fittig u. Ebert, A. 216 p. 162, s. a. Perkin, Zschr. f. C. 1871 p. 94 u. 179. — 127. Ebert, A. 226 p. 347. — 128. Rössing, B. 17 p. 3000. — 129. Hill u. Jackson, B. 20 p. 252. — 130. J. Tafel, B. 20 p. 398. — 131. Doebereiner, A. 3 p. 141. — 132. O. Fischer, A. 206 p. 141. — 133. Baeyer, B. 5 p. 25. — 134. Hantzsch, B. 19 p. 1398. — 135. Fittig, B. 18 p. 2526, p. 3410. — 136. Brühl, A. 235 p. 7, 43, 89, 92, 102; A. 236 p. 258. — 137. S. Kapf u. C. Paal, B. 21 p. 1485 u. p. 3053. — 138. Japp u. Miller, B. 17 p. 2829. — 139. Japp u. Klingemann, B. 21 p. 2932. — 140. Japp u. Burton, Chem. Soc. Trans. 1887 p. 430. — 141. P. Mehne, B. 21 p. 423. — 142. H. B. Hill u. A. B. Palmer, Am. Chem. Journ. 10 p. 373; B. 21 (R.) p. 890. — 143. W. Markwald, B. 21 p. 1080. — 144. Döbner, A. 242 p. 284. — 145. E. Merk, B. 21, p. 2709. — 146. M. Jaffé u. R. Cohn, B. 20 p. 2314. — 147. H. B. Hill, B. 20 p. 3359. — 148. W. Markwald, B. 20 p. 2811. — 149. Jaffé u. Kohn, B. 20 p. 2314. — 150. W. Markwald, B. 21 p. 1398. — 151. Jaffé u. Kohn, B. 21 p. 3461. — 152. von Udransky, Ztschr. f. phys. Chem. 1880 Bd. 12. — 153. Bötttinger, A. 247 p. 255. — 154. Sohst u. Tollens, A. 245 p. 22. — 155. G. Magnagnini, B. 21 p. 1523. — 156. R. Fittig u. A. Schlösser, B. 21 p. 2133. — 157. A. Polonowsky, A. 240 p. 1 u. B. 21 p. 2499. — 158. R. Fittig u. A. Hantsch, B. 21 p. 3189.

Furfuran findet sich im Holztheeröl vor und entsteht durch trockne Destillation von pyroschleimsaurem Baryt.


Die Konstitutionsformel des Furfurans ¹⁾



wird durch seine Darstellung aus




nahegelegt und weist auf die Fähigkeit der Furfuranderivate Tetraadditionsprodukte zu bilden hin. Angesichts der großen Widerstandsfähigkeit des im Molecül enthaltenen Sauerstoffs muß die Auffassung des Furfurans als ein Tetrolphenol^(4, 89) hinfällig erscheinen; umsomehr als dasselbe durch seine Synthesen resp. die seiner Derivate in direkte Beziehung zu dem analog gebauten Pyrrol und Thiophen gesetzt wird; so entsteht insbesondere Pyrrol durch Destillation des schleimsauren Ammons, ein Vorgang, der seinen ungezwungenen Ausdruck in folgender Gleichung finden kann:




¹⁾ Über die Nomenclatur s. a. (98, 92).


Daher können auch die Formeln:




verworfen werden, da auch die Entstehung von α -Naphtylamin aus Furfuran und Anilin:




für die obige Konstitution spricht, von der abzugehen weder die Isomerieverhältnisse noch irgend eine Synthese Veranlassung giebt. Für die Formel




im Gegensatz zu der



spricht auch die Bildung von Propiondicarbonsäure:



aus Furfuracrylsäure:




Von den Eigenschaften tritt seine Kondensationsfähigkeit mit Isatin, Phenanthrenchinon und Methylal in den Vordergrund; es wird schon in der Kälte von verdünnten Säuren kondensiert.


Gruppe A.

Die Alkylderivate sind nicht auf direktem Wege darzustellen; bemerkenswert ist die Synthese von Phenylmethyلفur-

schleimsäure erhaltene Dibromfurfuran ist, wie aus seiner Oxydation zu Fumar- resp. Maleinsäure hervorgeht, ein $\alpha\alpha$ -Derivat:



Durch Addition von Brom geht das $\alpha\alpha$ -Dibromfurfuran in $\alpha\alpha$ -Dibromfurfurantetrabromid über, dessen $\beta\beta$ -Isomeres beim Bromieren von Brenzschleimsäure entsteht





$\alpha\alpha$ -Dibromfurfurantetrabromid und $\beta\beta$ -Isomeres.

Die Entstehung von Isodibrombernsteinsäure aus (I) und von Dibrombernsteinsäure aus (II)^(19, 21) muß ihre Erklärung in den zahlreichen Übergängen zwischen Fumar- und Maleinsäure resp. der aus ihnen zu erhaltenden gebromten Bernsteinsäure finden.¹⁾


Zur Synthese von säureradicalsubstituierten Furfuranen geben die Kondensationsprodukte des Furfurols mit Ketonen Gelegenheit; das Furil $\text{C}_4\text{H}_3\text{O} \cdot \text{CO} - \text{CO} \cdot \text{C}_4\text{H}_3\text{O}$ schließt sich nach Entstehung und Zerfall ganz seinem Analogon in der Benzolreihe an.

Die Konstitution des Aldehyds der Furfurancarbonsäure, des Furfurols, erhellt aus folgenden Umformungen:




Furfurpropionsäure;

durch Oxydation entsteht aus Furfurpropionsäure:



¹⁾ s. a. Petri A. 195 p. 67 u. w. unten.

die reduziert zur





führt und dadurch die Stellung der Aldehydgruppe charakterisiert.


Kondensationen mit Acetonen, Aldehyden, Aminbasen (s. w. u.) kennzeichnen, wie in der aromatischen Reihe die (COH)gruppe. Die durch Einwirkung von Salzsäure und Phenolen entstehenden chlorophyllartigen Farbstoffe bilden sich wahrscheinlich aus zunächst entstehendem phenolsubstituierten Alkohol.^(28, 73)

Wie das Benzaldehyd polymerisiert sich das Furfural und es entsteht Furoin, das bei der Oxydation in Furil übergeht; in der Mitte zwischen Benzoin und Furoin steht das Benzfuroin.

Durch Destillation der Schleimsäure entsteht Furfurandi- resp. monocarbonsäure. Eine ganze Gruppe von Säuren entsteht bei der Kondensation von Chloracetessigäther mit Natriumphenolaten⁽¹¹⁾; der Prozeß verläuft in 2 Stadien:




Da die aus Dimethylcumarin dargestellte Dimethylcumarilsäure identisch mit der aus p-Kresolnatrium und Chloracetessigäther dargestellten Dimethylcumaroncarbonsäure ist,⁽¹⁷⁾ so ist das Naphtalinanalogon des Furfurans, das




in direkte Beziehung zu der Cumaringruppe gesetzt.

Der obige Prozess verläuft in analoger, doch komplizierterer Weise bei den mehrfach hydroxylierten Benzolen; so können aus Phloroglucin und Chloracetessigäther Dioxyecumaron-, Oxybenzodifurfuran- und Benzotrifurfuranabkömmlinge entstehen, je nachdem das Mono-, Di- und Trinatriumsalz in Reaktion tritt; doch findet stets die Bildung der 3 Körper nebeneinander statt.⁽¹⁵⁾


Die Entscheidung, an welcher Stelle die Schließung des Furanringes stattgefunden hat, kann analog wie in der Pyridinreihe stattfinden: so kann zwischen den Oxyecumaronen (1) und (2)




kein Zweifel bestehen, da sich aus (1) sowohl ein normales Benzodifurfuran der Anthracengruppe (III) als auch ein solches der Phenanthrengruppe (IV) bilden kann, während (2) nur zu letzterem führt:




Chloracetessigäther + Oxymethylcumarilsäure = m-Benzodimethyldifurfuran-dicarbonsäure;






Die Reaktion vollzieht sich leichter beim Naphtol als beim Phenol; schwerer findet sie beim Nitrophenol statt und zwar ist — wie beim Kresol — das Orthoderivat das trügste; hieran schließt sich das der Meta-, dann das der Parareihe an.^(92, 14)

Charakteristisch für die Cumaroncarbonsäuren sind die Farbreaktionen mit conc. Schwefelsäure; beim Erhitzen spalten sie Kohlensäure ab und gehen in kohlenwasserstoffs substituierte Furfurane resp. Oxyfurfurane über. Es scheint, daß die Gegenwart von Methyl das Cumaron labiler macht, da die Methylcumarilsäure sich schon beim Schmelzen zersetzt, während Cumarilsäure unverändert zu destillieren ist;⁽¹⁷⁾ doch weist der Übergang der Aldehydphenoxylessigsäure in Cumaron, — vermutlich unter intermediärer Bildung von Cumarilsäure —



auf deren Fähigkeit, Kohlensäure abzuspalten, hin.⁽¹¹⁾

Von den Reaktionen der Halogene auf Furfurancarbonsäuren ist besonders das Verhalten der Pyroschleimsäure gegenüber Brom interessant, das die Beziehungen zwischen




Pyroschleimsäure; Fumarsäure; Maleinsäure; Bernsteinsäure illustriert: Brom substituiert in der eisessigsäuren Lösung von Pyroschleimsäure 1 Atom Wasserstoff, während trocknes Brom zu einem Tetraadditionsprodukt führt; weitere Bromierung der Monobrompyroschleimsäure oxydiert dieselbe zu Fumarsäure⁽²¹⁾, wodurch


ihre Konstitution als δ -Derivat klargelegt wird. Zu gleicher Zeit bromierend und oxydierend ist die Einwirkung auf die wässrige Lösung der Pyroschleimsäure unter Entstehung von Mucobromsäure, des Halbaldehyds der Dibrommaleinsäure^(4, 20); dagegen findet bei Vermeidung eines Bromüberschusses nur Oxydation zu Fumarsäure, resp. deren Aldehyd statt^(4, 21). Die bei der raschen Einwirkung von Brom und Wasser entstehenden Dibrombernstein- und Isodibrombernsteinsäuren⁽²¹⁾ verdanken offenbar ihre Entstehung zunächst gebildeter Fumar- und Maleinsäure (s. o.); das bei dieser Gelegenheit gebildete Dibromfurfurantetrabromid charakterisiert die 4 Methingruppen.

Durch Reaktion von Schwefelsäure entstehen Substitutionsprodukte; dagegen sind mit Hülfe von Salpetersäure keine Derivate auf direktem Wege dargestellt.


In bester Weise vereinbar mit der Konstitution des Furfurans (I) wäre die Entstehung der Carbopyrotritisäure aus



und diejenige des Pyrotritisäureäthers aus Acetonylacetessigäther sowie die des Diphenylfurfurandicarbonsäureäthers aus Dibenzoylbernsteinsäureäther¹⁾, wenn nicht die Synthese der isomeren Metronsäure aus



¹⁾ In analoger Weise scheint die Bildung eines Furfuranderivates aus Diacetylallavulinsäure vor sich zu gehen:




derivaten ist insofern einer Verallgemeinerung fähig als der Acetessigester durch einen anderen β -Ketonsäureester zu ersetzen ist (Benzoylessigester) und die Bernsteinsäure durch Brenzweinsäure. Ein in dieser Weise dargestelltes Isomeres der Phenylmethylfurfurancarbonsäure (Phenweinsäure) zeichnet sich dadurch aus, daß es durch Kohlensäureverlust in Phenylmethylfurfuran übergeht.⁽¹⁵⁶⁾


Bemerkenswert ist es noch, daß die durch Kondensation von Glyoxal mit Acetessigester entstehende Säure⁽¹⁵⁷⁾ (Sylvan-carbon-essigsäure genannt) sich als identisch mit Metronsäure erwies; die durch Kohlensäureverlust aus ihr hervorgehende Säure, Sylvan-carbonsäure genannt, ist Pyrotritisäure.⁽¹⁵⁸⁾

Gruppe C.

Die Analogie zwischen der Benzol- und Furfuranreihe zeigt sich auch in dem Verhalten des Ammoniaks gegen Furfurol: es entsteht die dem Hydrobenzamid entsprechende Verbindung Furfuramid:



das durch Umlagerung in ein Amarinanalogon übergeht:



dasselbe bildet mit Säurechloriden Derivate und zersetzliche Doppelverbindungen; im Gegensatz zu dem Amarin ist es nur einmal zu acetylieren, vielleicht infolge der Gegenwart des elektro-negativen Sauerstoffs.⁽¹⁰³⁾

Wie schon aus der Gegenwart der Aldehydgruppe im Furfurol zu vermuten ist, kondensiert sich Furfurol mit aromatischen Aminen zu Farbstoffen; dieselben weichen vielfach von den entsprechenden Verbindungen der Benzolreihe ab.

Furfurol vereint sich mit


- a) Anilin, p-Toluidin, Diphenylamin im Verhältnis:
1 Molecül Furfurol + 2 Molecüle Base + 1 Molecül Säure;
- b) m-Nitranilin und m-Amidobenzoësäure im Verhältnis:
1 Molecül Furfurol + 1 Molecül Base + 1 Molecül Säure^(108. 2).
- c) Benzidin, m-Amidophenol, m-Toluyldiamin nehmen mit jeder Amidgruppe 1 Molecül Furfurol auf, unter

Austritt von Wasser, das durch Säurezusatz wieder aufgenommen wird;

- d) Aromatische Aminsäuren reagieren in dem Verhältniß (a), indem die Aminsäure zu gleicher Zeit ein Molecül Base und Säure liefert⁽⁹⁸⁾;
- e) o-Diamine bilden beständige Aldehydinbasen, deren Salze ungefärbt sind^(116, 117);
- f) Tertiäre Amine reagieren nur unter Beihülfe eines wasserentziehenden Agens; die Derivate sind ganz denen der aromatischen Reihe entsprechend⁽¹³²⁾;
- g) Aliphatische Aminbasen führen zu Verbindungen von dem Charakter der Ammoniumbasen; mit Säuren entstehen keine Farbstoffe⁽¹¹⁸⁾.

Dafs in der That die Aldehydgruppe die Ursache der Farbstoffbildung ist, erhellt daraus, dafs aus Verbindungen mit unzugänglicher (COH)gruppe (wie Pyroschleimsäure, Pyromucamid etc.) die Farbreaktion ausbleibt, aber eintritt, sobald die Gruppe regeneriert wird⁽¹²²⁾.

Die Farbbasen können als Derivate eines hypothetischen




Furfurandiphenylmethans


betrachtet werden; die Farbstoffbildung selber scheint in folgender Weise zu verlaufen, z. B.:



dieses geht durch Einwirkung von Säuren über in




das unter Aufnahme von Wasser und Salzsäure in



übergeht⁽⁹⁸⁾.

Auch durch Einwirkung von Furfuralkohol auf Anilin entsteht ein Farbstoff, aus dem die Konstituenten sich nicht regenerieren lassen⁽⁹⁹⁾.

No.	Name	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siedepunkt
Gruppe A.					
1.	Furfuran $\begin{array}{c} \text{CH} = \text{CH} \\ \\ \text{CH} = \text{CH} \end{array} \rangle \text{O.}$	Findet sich im Holztheeröl. ⁽¹⁾ 1. Natronkalk auf pyroschleimsaures Barium. (H.) ^(3, 4) 2. Phosphor-pentachlorid auf Dihydrofurfuran (aus Erythrit.) ⁽²⁾	Flüssigkeit, farblos, erstarrt beim Verdunsten oder in Kältemischung.		32° (123)
	Dihydrofurfuran C ₄ H ₆ O.	(H.) auf das durch Kochen von Erythrit mit Ameisensäure erhaltene Formategemenge. ⁽²⁾	Flüssigkeit.		67°
2.	Methylfurfuran (Sylvan) C ₄ H ₃ OCH ₃ .	Destillation von Holztheeröl. ⁽¹⁾	Flüssigkeit, farblos, an der Luft gelblich.		c. 63°
3.	αα-Dimethylfurfuran C ₄ H ₂ O(CH ₃) ₂ .	1. (H) auf Carbopyrrotitars. — 2. Chlorzink oder Phosphorpentoxyd auf Acetonylaceton. (H.) ⁽¹²¹⁾	Flüssigkeit, farblos, leicht beweglich.		94°
4.	Furfurbutylen C ₄ H ₃ OCH:C(CH ₃) ₂ .	Isobuttersäureanhydrid u. isobutters. Natrium auf Furfurol. (H.) ^(1, 10)	Öl, farblos, bräunt sich und verharzt.		153°
5.	Cumaron 	1. Destillation von cumarilsaurem Kalk. ⁽¹²⁶⁾ — 2. Aldehydphenoxylessigsäure, Essigsäureanhydrid u. Natriumacetat. (H.) ⁽¹²⁸⁾	Öl, erstarrt bei — 18° nicht.		168.5 b 169.5 d Wssd flüchti

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. w.	Farbenreaktion	Andere	
the- isch, ähn- lich dem Chlo- form (123)	n.			N: Alka- lien.	Eisenchlorid gibt keine Fär- bung. Zeigt Isatin- u. Lau- benheimersche Reaktion ⁽⁵⁾ ; Fichtenspahn- reaktion. ⁽¹²⁵⁾	Alkalien verändern es nicht. Alkalimetalle entwickeln keinen Wasserstoff. Verd. Säuren geben eine amorphe braunschwarze Masse, resp. ein leichtes, hell- braunes Pulver (schon in der Kälte) ($C_{12}H_{10}O_2?$); konz. Salzs. wirkt explosionsartig ebenso. ^(6, 4) Von Salzs. wird es nicht zersetzt, sondern nur braun gefärbt. ⁽¹²³⁾ Mit Brom: Substitutionsprod. ⁽⁷⁾ Mit Methylal feste Kondensa- tionsprodukte. ⁽⁵⁾ Von Säuren und Alkalien nicht angegriffen. Phosphorpenta- chlorid führt in Furfuran über. Alkalien od. metallisches Natrium reagieren nicht; konz. Salzs. bildet theerartige und feste Kon- densationsprod. Salzsäuregas erzeugt in ätherisch. Lös. eine Flüssigkeit von Sp. 235—245° ($C_{15}H_{22}O_2?$). Kaliumperman- ganat oxydiert zu Essigsäure.	Spez. Gew.: 0,887.
	n.			N: wssg. Alkalien: mit den üblichen Lösungs- mitteln mischbar.		Konz. Säuren verharzen. Beim Erhitzen mit Wss. u. Salzs. entsteht Acetylacetone. Jod- wasser und Phosphor verharzen. Mit salpetriger Säure: die in grofs. Tafeln krystallis. Verb.: $C_8H_7ON_2O_3$ (Schmelzp. 94°).	Spez. Gew.: 0,9509 (14,5°).
	n.					Mittelst H_2SO_4 und HJ ent- stehen Kondensationsprod. ⁽¹²⁷⁾ .	

No.	Name	Entstehung	Aussehen		Schmelzpunkt	Siedepunkt
6.	β-Methylcumaron C_9H_8O .	1. (H) auf Methylcumarils. — 2. Kalk auf Methylcumarils. (H.) ⁽¹¹⁾				188 bis 189° Wssd. flüchtig.
7.	Phenylmethylfurfuran $C_4H_2OC_6H_5CH_3$.	Essigsäureanhydrid oder rauch. Salzs. auf Acetophenonaceton. (H.) ⁽¹³⁾	Öl; gelb bei längerem Aufbewahren.	Alk. lange glänzende Nadeln.	41—42°	235 bis 240°.
	Isomeres.	Entsteht daneben. ⁽¹²⁾		Alk.: lange feine verwitternde Nadeln.	82—83°	Destill. unter Zersetzung. Wssd. flüchtig.
	Phenylhydrazinverb.			Goldgelbe Blättchen.	154 bis 155°	c. 230°
	Tetrahydrophenylmethylfurfuran $C_{11}H_{14}O$.	Natrium auf Phenylmethylfurfuran in alk. Lös. ⁽¹³⁾	Flüssigkeit, farblos, leicht beweglich.			
8.	Methyl-α-naphtofurfuran $C_{12}H_7(CH_3)O$.	(H) auf Methylnaphtofurfuransäure und alk. Kali auf den Ester. ⁽¹⁷⁾	Gelbliches, grün fluorescirendes, an der Luft verharzendes Öl, erstarrt bei — 12°.		34—35°	297 bis 299° Wssd. flüchtig.
9.	Methyl-β-naphtofurfuran $C_{12}H_7(CH_3H)O$.	(H) auf das Kalksalz der Methyl- β -naphtofurancarbonsäure. ⁽¹⁷⁾	Öl, bräunt sich an der Luft, erstarrt krystallinisch.		59°	

Namen	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. w.	Farbenreaktion	Andere	
Phosphor- säure- löslich.				N: Kali.			
Phosphor- säure- löslich.	n.	l.		N: Alka- lien, l: Essigs., zer- fliess- lich: Petrol- äther, Schwe- felkoh- lenstoff. Sch.: Schwe- felkoh- lenstoff.		Von Natriumamalgan nicht verändert, ebenso nicht von Hydroxylamin und Phenylhydrazin. Jodwasserstoff und amorpher Phosphor bilden einen Kohlen- wasserstoff. Sp. 210 bis 220°. Chroms. oder Kaliumperman- ganat oxydieren zu Benzoës.	
	n.			N: wssg. Alka- lien.			
	l.	l.	l.		Die grüngelbe Lös. in Schwefels. grün durch (H.), dann purpurrot; Wss. färbt grün. Chlor- kalk gelbbraun, Säuren grün.	Silberniträt reduziert beim Kochen.	
					Konz. Schwefels. färbt blau. (H.)		

No.	Name	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siedepunkt
10.	$\alpha\alpha$-Diphenylfurfuran $C_6H_5O(C_6H_5)_2$.	1. Salzs. auf Phenylacetylenbenzoylessigs. (H. unter Druck). — 2. Destillation der Phenylacetylenbenzoylessigs. u. Diphenylfurfurancarbons. üb. Znstaub. — 3. Salzs. auf Diphenacyl (H. unter Druck). ⁽¹³⁷⁾	Alk.: große, glänzende Blätter oder Nadeln.	91°	343 bis 345° (unzer setzt)
11.	$\alpha\alpha$-Diphenyltetrahydrofurfuran.	Natrium auf die alk. Lös. von Diphenylfurfuran. ⁽¹³⁷⁾	Dickflüssiges, farbloses Öl.		
12.	Diphenylenmethyldifurfuran $C_6H_4 - C - CH$ $C_6H_4 - C \begin{matrix} \parallel \\ O \end{matrix} CCH_3$.	Zink u. Essigs. od. rauch. Jodwasserstoffs. auf Acetophenonanthrachinon. (H.) ⁽¹³⁹⁾		123 bis 124°	
13.	$\alpha\alpha\beta$-Triphenylfurfuran $(C_6H_5)_3C_4HO$	Rauch. Jodwasserstoffs. auf Anhydroacetophenonbenzil. ⁽¹⁴⁰⁾		92–93°	
14.	p-Benzodimethyldifurfuran $C_6H_2(CCH_3 \diagdown CH)_2$.	(H) auf das mit Kalk gemischte Kaliumsalz der p-Benzodimethyldifurfurandicarbons. ⁽¹⁴⁾	Äth.: perlmutterglzd. blaufluoreszierende Tafeln.	108°	
15.	m-Benzo-β-dimethyldifurfuran $C_6H_2(C \cdot (CH_3) \diagdown CH)_2$.	(H) auf das mit Kalk gemischte Kaliumsalz der m-Benzo- β -Dimethyldifurfurandicarbons. ⁽³¹⁾	Öl, hellbraun, erstarrt in einer Kältemischung.	17° 27° ⁽¹²⁵⁾	270° (720 mm)
16.	Benzotrimethyltrifurfuran $C_6(CCH_3 \diagdown CH)_3$.	(H) auf das mit Kalk gemischte Kaliumsalz der Benzotrimethyltrifurfurandicarbons. ⁽¹⁵⁾	Nadelförmige, sich bräunende Krystalle.	115° 120°	
Gruppe B.					
17.	Furfuralmonochlorid.	Phosphorchlorid auf Furfurol. ⁽⁹⁸⁾	Flüssigkeit, leicht beweglich.		

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. w.	Farbenreaktion	Andere	
Senf- öl- artig.	n.	l.	l.	1: Eis- essig, Benzol, Ligroin.	Konz. Schwefels. löst grün; beim Erhitzen rotbraun mit blau- grüner Fluorescenz. Durch Isatin und Schwefels. dunkel- graue Färbung.		Bei der Reduktion mit P und HJ und durch Br entstehen harzige Produkte.
	n.			misch- bar mit den Lö- sungs- mitteln.			PCl_3 u. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OCl}$ greifen nicht merk- lich an.
	l.	l.	l.		Mit Schwefels. blaue Färbung.		
	l.	l.	l.		Schwefels. giebt grüne Lösung.		
					Mit Phosphoroxychlo- rid und Dimethyl- anilin entstehen blaue zersetzliche Verbdg.	Phosphoroxychlorid zersetzt. Mit Phos- phoroxychlorid und aromatischen Basen: Chlorhydrate der Farbstoffbasen.	


No.	N a m e	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siedepunkt
18.	Triphenylchlorfurfuran $C_4(C_6H_5)_3ClO$ $\alpha\alpha\beta\beta$.	Alk. Salzs. auf Anhydroacetophenonbenzil. ⁽¹⁴⁰⁾		115°	
19.	Furfuraldichlorid $C_4H_3O \cdot CHCl_2$.	Phosphorpentachlorid auf Furfurol (H.). ⁽⁹⁹⁾	fest, schwarz, glänzend.		
20.	Monobromcumaron C_8H_5BrO .	Alk. Kali auf Dibromcumaron. (H.). ⁽¹²⁷⁾	Nadeln	36°	Wssd. flüchtig
21.	α-Dibromfurfuran $C_4H_2Br_2O$.	Brom auf Monobrompyroschleims. ⁽¹⁹⁾ NB. Ein Dibromfurfuran auch durch direktes Bromieren des Furfurans. ⁽⁷⁾	Öl, farblos, schw. erstarrt in K.	9—10°	164 bis 165° etwas zersetzt 62—63° (15 mm unzer- setzt) (s. a. 18)
	Polymeres.	Luft auf das vorige.	gelb, amorph.		
22.	Cumarondibromid $C_8H_4Br_2O$.	Brom auf Cumaron. ⁽¹²⁶⁾	Schwefelkohlenstoff: farblose Prismen.	86°	
23.	Tetrabromfurfuran $C_4Br_{2.4}O$.	1. Alk. Kalilauge auf α -Dibromtetrabromid. ⁽¹⁹⁾ 2. Wssg. Brom auf Tribrompyroschleims. ⁽²⁰⁾	Alk.: lange seidenglänz. Nadeln.	63°	
24.	Bromphenylmethylfuran-tetrabromid $C_{11}H_9Br_5O$	Phenylmethylfurfuran auf Brom (K.). ⁽¹³⁾	Metallglz. bronze-farbige Blättchen.	208 bis 210° (200° Schwärzung).	
25.	α-Dibromfurfuran-tetrabromid $C_4H_2Br_6O$.	1. Brom auf Monobrompyroschleims. in alkal. Lös. ⁽²¹⁾ 2. Brom auf α -Dibromfurfuran. ⁽¹⁹⁾	feine, farb. Prismen.	110 bis 111°	

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. W.	Farbenreaktion	Andere	
senf- öl- artig.			l.	L: Schwefelkohlenstoff, Benzin, Ligroin, Chloroform etc.		Beim Zersetzen mit Wss. $C_{10}H_6O_3$.	Durch Na.-amalgam entsteht Triphenylfurfuran.
	lös.	lös.		N: Alkali.			NB. Über Bromfurfurane s. a. ⁽¹⁸⁾
aroma- tisch.				N: gew. Lösungsmittel.		Mit Wss. überschieftet unter Luftzutritt: Bromwasserstoff u. Maleins. Salpeters. (K.) giebt Maleins. Salpeters. (H.) giebt Fumars.	Reagiert stark sauer.
				N: gew. Lösungsmittel.		Bromwss. od. verd. Salpeters. führen beim Kochen in Dibrommaleins. über. ⁽¹⁹⁾	Leicht zersetzlich.
			l.	L: Chloroform, Schwefelkohlenstoff.		Beim Erhitzen mit Lösungsmitteln (Eisessig angenommen) zersetzt.	
						Wss. beim Kochen: Bromwasserstoff u. Monobromfumar. In neutral. Lös: Monobrommaleins. Rauch. Salpeters.: Isodibrombernsteins. (K)	

No.	Name	Entstehung	Aussehen		Schmelzpunkt	Siedepunkt
26.	β-Dibromfurfuran-tetrabromid $C_4H_2Br_6O$.	Brom auf Monobrompyroschleims. in alkal. Lös. ⁽¹⁹⁾			c. 55°	
27.	Tetrabromfurfuran-dibromid C_4Br_6O .	Brom auf Tetrabromfurfuran ⁽¹⁹⁾		Sechseitige Blättchen.	122 bis 123°	
28.	Furfuraldoxid $C_4H_3O.CH:NOH$.	Salzsaurem Hydroxylamin in wssg. mit Natriumcarbonat versetzter Lös. auf Furfuröl. ⁽²²⁾		Nadeln.	89°	201 bis 208° Destill. unter gering. Zersetz.
	$C_4H_3O.CH:NOH.HCl$.	Trockner Salzs. auf wasserfreies Aldoxim in ätherischer Lös.		Weißes Krystallpulv.		
	$C_4H_3O.CH:NO Na + 3H_2O$	Natriumalkoholat auf Aldoximlös. in trockenem Äth.		Weisse Schüppchen.		
	$C_4H_3O.CH:NO.C_2H_5$.	Äthyljodid und Natriumalkoholat auf das Aldoxim (H.).	Flüssigkeit, farblos.			destillb. (wenig zer- setzt) Wssd. leicht flüchtig.
29.	Furfurnitroäthylen $C_4H_3O.CH:CH.NO_2$	Nitromethan auf Furfuröl in alkal. Lös. ⁽²³⁾		Petroläther: lange, gelbe, glänzende Prismen.	74—75°	Wssd. leicht flüchtig.
30.	Nitrofurfurnitroäthylen $C_4H_3(NO_2)O.CH:CH.NO_2$	Salpeters. auf Furfurnitroäthylen. ⁽²³⁾		Alk.: kleine verfilzte, hellgelbe Ndl.	143 bis 144°	
31.	Nitrofurfurnitroäthylen-dibromid $C_4Br_2NO_2O.CHCHNO_2$	Brom auf Nitrofurfurnitroäthylen. ⁽²³⁾		Hellgelbe Prismen.	110 bis 111°	
32.	Furfuralaceton $C_4H_3O.CH:CH.CO.CH_3$	Natron auf Aceton u. Furfuröl in wssg. Lös. ^(24,25)	Oel, hellgelb, dicklich, erstarrt zu harter, krystall. Masse.	Aus dem Schmelzflufs kurze, dicke Prismen.	39—40°	

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. w.	Farbenreaktion	Andere	
beisend.		l.	l.	Sch: Ligroin. Schwefelkohlenstoff; l: Benzol; l: Chloroform.		Rauch. Salpeters.: gewöhnliche Dibrombernsteins. Wss. beim Kochen: Dibrommaleins.	
	sch.	l.	l.	l: Schwefelkohlenstoff, Eisessig, Benzol.	Anilin bei Gegenwart einer Säure intensiv rot.	Säuren spalten Hydroxylamin ab.	
	l.	l.				Chroms.mischung: Nitropyroschleims.	Beißender Geschmack; reizt Haut u. Schleimhäute stark.
					Acetylchlorid löst mit rötlich gelber Farbe, die nach kurz. Erwärmen in smaragdgrün übergeht.		

No.	N a m e	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siedepunkt
33.	Difurfuralaceton $(C_4H_3O.CH:CH)_2CO$	Natron auf Aceton u. überschüssiges Furfurol in wssg. Lös. ⁽²⁵⁾	Oel kry- stallis.	Ligroin: flache, citron- gelbe, am Licht sich bräun. Prismen.	60—61°
34.	Benzalfurfuralaceton $C_4H_3O.CH:CH.CO.$ $CH:CHC_6H_5.$	1. Benzalaceton auf Fur- furol. — 2. Benzaldehyd auf Furfuralaceton. ⁽²⁵⁾	Siedendem Ligroin: strohgelbe Blättchen od. flache Prismen.	55—56°	
35.	Furil $C_4H_3O.CO.CO.C_4H_3O.$	Luft auf alkalische Lös. von Furoin. ⁽²⁶⁾	Goldgelbe Nadeln.	162°	
36.	Furoin $C_4H_3O.CO.CH.(OH).$ $C_4H_3O.$	Cyankaliumlös. auf Fur- furol. (H.) ⁽²⁶⁾	farblose, feine Prismen.	135°	Bei Luftab- schluß unzer- setzt destil- lierbar.
37.	Uvinon $C_4(CH_3)_2O.CO.CO.C_4$ $(H_3C)_2O.$	(H.) auf Carbopyrotritar. od. Pyrotritar. ⁽⁶⁾	Eisessig: büschel- förmig ver- einte Nadeln.	247,5°	Subli- miert in fein- gelben Nadeln.



Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. w.	Farbenreaktion	Andere	
		1.	1.	Sch.: Ligroin 1: Chloro- form.	Konz. Schwefels. Salzs. od. Acetylchlorid geben eine dunkel- rote Lös.		
	1.	1.	1.	1: Benzol. Chloro- form.	Konz. Schwefels. giebt dunkelrote Lös.		
	sch.	sch. (k.)	sch. k.	1: Chloro- form.		Natriumamalgam re- duziert die alk. Lös. leicht. Alkalien (H.) bilden Furils. — Alk. auf ein Ge- menge von Fural u. etwas Cyankalium bildet Furfurol u. Pyroschleims- äthylester. (secundär: Furoin. ⁽²⁷⁾)	
	sch. l. (h.) (h.)		sch.	1: Toluol.	Konz. Schwefels. giebt blaugrüne Lös., die schon in der Kälte, schnell beim Erwär- men braunrot wird. Wss. od. alk. Alka- lien geben blaugrüne, im durchfallenden Licht tief dunkelrote Lös., die d. Luft od. Oxydationsmittel farb- los (Fural) werden.	Reduziert alkal. Kupfer- lös. (K) Starke Salzs. od. Jodwss.stoff geben dunkelbraunes Harz. Natriumamalgam entfärbt die alk. Lös.; worauf verd. Schwefels. gelbe, harzartig zusammen- ballende Flocken aus- scheidet. Zinkstaub u. Salzs. reduzieren die alk. Lös. zu einer Verb., die durch Wss. als rot- braunes, zum größten Teil unzersetzt destillier- bares blumenartig riech. Öl gefällt wird.	
	n. sch. (h.)			sch.: Eis- essig, Benzol, Aceton.	Schwefels. giebt eine grüne, fluorescierende Lös.	Zink u. Essigs. reduzieren. Destillation über Zink od. Phosphorpentachlorid od. Phosphoroxychlorid od. schmelzendes Kali verkohlen.	Salzs. Hy- droxylamin bildet eine in Alkali lös- liche Verb.

No.	N a m e	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siedepunkt
38.	Benzfuroil $C_6H_5 \cdot CO \cdot CO \cdot C_4H_3O$.	Schwach alkalischer Kupferlös. auf Benzfuroil in alk. Lös. ⁽²⁶⁾	feine, gelbe Nadeln.	41°.	unzer- setzt flüchtig.
39.	Benzfuroil $C_6H_5 \cdot CH \cdot (OH) \cdot CO \cdot C_4H_3O$ oder $C_6H_5CO \cdot CH(OH) \cdot C_4H_3O$.	Benzaldehyd auf Furfurol in alk. Lös. ⁽²⁶⁾	fein. Prismen.	137 bis 139°.	unzer- setzt destil- lierbar.
40.	Monobromfuroil $C_{10}H_5BrO_4$.	(H.) auf Furilactobromid ⁽²⁶⁾	Gelbe, glänz. Blättchen.		
41.	Dibromfuroil $C_{10}H_4Br_2O_4$.	(H.) auf Furilactobromid ⁽²⁶⁾	Alk.: Goldgelbe Blättchen	183 bis 184°.	unzer- setzt subli- mierbar.
42.	Benzfuroiltetrabromid $C_{12}H_8O_3Br_4$.	Brom auf Benzfuroil. ⁽²⁶⁾	Gelbe Nadeln.	127 bis 128°. (Zer- setzg.)	
43.	Furilactobromid $C_{10}H_6O_4Br_2$.	Brom auf Furil (K.). ⁽²⁶⁾	Gelbe Krystallmasse.	Bräu- nung 150°. 185° (Zer- setzg.)	
44.	Octobromuvinon $C_{14}H_4Br_8O_4$	Brom auf Uvinon (H.). ⁽⁸⁾	Rotgelbe Prismen.		
45.	Acetylfuroil $C_{10}H_7(C_2H_3O)O_4$	Essigs.anhydrid auf Furoil (H.). ⁽²⁶⁾	Farblose, warzenförmig vereinte Nadeln.	76—77°.	destil- lierbar.
46.	Furfuralkohol $C_4H_3O \cdot CH_2 \cdot OH$.	1. Natriumamalgam auf Furfurol in wssg. essigs. Lös. ^(28, 29) — 2. alk. Kali auf Furfurol. ⁽⁴⁾ 3. Wss. Kali auf Furfurol. ⁽¹⁾ ⁽⁹⁸⁾	Flüssigkeit, syrupartig resp. gummiartig.		destil- lierbar.

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	n. s. w.	Farbenreaktion	Andere	
		l.	l.			Alkalien lösen zu Benzfurils.	Additionsprodukte mit 4 At. Brom.
	sch.	l.(h.)		sch.: Ligroin; l: Chloroform, Benzol.	Alk. Kali giebt dunkelrote Lös. mit schwach blaugrünem Reflex.	An der Luft wird die alkal. Lös. zu Benzoës. oxydiert. Verd. Salpeters. od. Chroms.: Benzaldehyd.	
		l.					
	sch.	sch.				Alkalien lösen zu Dibromfurils. (H)	
		sch.		l: Chloroform.			
		sch.		Sch: sied. Chloroform.		Beim Verdampfen der Lös. in Chloroform zersetzt.	
				Sch: gewöhnlich. Lösungsmittel.		Verkohlt bei höherer Temperatur.	Eine bromreichere analoge Verb. bei Einw. v. Brom. (K.)
	sch.	l.	l.	Sch: Ligroin.		Vonalk. Kali verseift.	
	lös.	lös.	lös.		Salzs. färbt grün. ⁽²⁸⁾ Anilin fällt aus d. wssg. Lös. gelbe Flocken. $C_{11}H_{11}NO$. — deren alkohol. Lös. mit salzs. Anilin — grüne Schuppen ($C_{11}H_{11}NO \cdot C_6H_7NH_2HCl$) ausscheiden. ⁽²⁹⁾	Beim Erhitzen Condensationsprodukte. Die wss. Lös. wird von Kali in Ameisens., Essigs., Bernsteins., Kohlens. umgesetzt ⁽⁴⁾	

No.	N a m e	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siedepunkt
47.	Äthylfurfurcarbinol $C_4H_3O \cdot CH(OH)C_2H_5$.	Zinkäthyl auf Furfural und Destillation mit Wss. ⁽³⁰⁾	Flüssigkeit, farblos.		180°.
48.	m-Oxymethylcumaron $C_6H_2O \cdot (OH)CH \cdot CH_3$.	(H.) auf m-Oxymethylcumarils. ⁽⁴²⁾	Weisse, an der Luft grün werdende Nadeln.	96—97°	sublimierb. bei gew. Temp.
49.	Furfural $C_4H_3O \cdot CHO$.	Kommt vor im Holzeisig ^(32, 33) , im käuflichen Eisessig ⁽³⁴⁾ und Stärkezucker, in gegohrenen und destillierten Getränken, (namentlich im Fuselöl) ^(35, 36, 37) . Bildung aus Eiweiss. ⁽¹⁵²⁾ 1. (H.) auf die Kohlehydrate u. ihre nächsten Abkömmlinge (aber nicht auf Fette). ^(32, 38, 39) — 2. Wasser auf Sägespäne (H.). ^(200°) ^(40, 41) — 3. Wärme auf reine Zuckerlösungen od. saure Flüssigkeiten, die Zucker oder andere Kohlehydrate enthalten. ^(35, 36) — 4. Schwefels. od. schwefels. Thonerde auf Krapp od. ostindischen Krapp (H.) ⁽⁴²⁾ 5. Chlorzinkl. auf Kleie. (H.) ⁽⁴³⁾ — 6. Verd. Schwefels. auf Leinsamenmehl, ⁽⁴⁴⁾ Cocosnufsschalen, Getreidemehl, Sägemehl, Kleie ^(44, 45, 46, 47) (auch auf reine Cellulose, Stärke od. arabisches Gummi) ^(47, 48, 33) — [7. Calciumformiat auf Calciumpyromucat. (H.). — 8. (H.) auf Calciumpyromucat — 9. (H.) auf Pyroschleims. — 10. (H.) auf Hydrofurfuramid. — 11. (H.) auf Furfurin. — 12. (H.) und Luft auf Furoin — od. 13. Furindampf ⁽⁴⁹⁾]	Flüssigkeit, farblos, an der Luft sich bräunend.		161.6°. (50)

	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	Anderes	Farbenreaktion	Andere	
erz-ft.	lösl.						Sp. G. 1,066 (0°).
	1.	1.	1.	l.: Alkali unzer- setzt.	Schwefels. färbt violett.		
ro-a- ch.	In 12 Tei- len bei 13°.				Mit Phenolen und Salzs. chlorophyll-ähnliche Farbstoffe: Wss. löst grün, durch Salzs. in blauen Flocken gefällt. — (s. a. 98, 124.) Mit den Anilinen: Farbstoffe. — Anilin u. Salzs. färben purpurrot (salzs. Furfuranilin) (44, 51, 36). Mit Alk. versetztes essigs. Xylidin wird rot. Salzs. od. salpeters. Harnstoff od. Allantoin wird tief violett. (52) Auch mit Alkoholen der Fettreihen entstehen violette bis blaue Farbstoffe. (98)	Salpeters. oxydiert zu Oxals. (44) Salpetrige S.: stark saures Harz. (53) Kalium reagiert (H) explosionsartig. Alk. (besser wssg. Kali) (H) (98) bilden Furfuralkohol u. Pyroschleims. — Natriumamalgam (4) bildet Furfuralkohol. (29) Vereinigt sich mit Hydroxylamin (22) u. Phenylhydrazin (54); mit Aldehyden u. Ketonen der Fettreihen zu ungesättigten Aldehyden. (55, 25) Silberoxyd oxydiert zu Pyroschleims. (56) Mit Chloral-ammoniak: krystallisierbare Verb. (59) Ebenso mit sauren schweflgs. Alkalien (56) s. a. Furfuramid, Furoin.	Refraction s. (136) Dispersion s. (136) Sp. G. 1,164 (13°) Sp. W s. (50) Bild. W. s. (57) Dichtigkeit beim Siedepunkt s. (58) sp. Vol. s. (58) Physiog. Ver- halten s. (151)

No.	N a m e	Entstehung	Aussehen		Schmelzpunkt	Siedepunkt
50.	Metafurfurol $C_5H_4O_2$.	Schwefels. auf Kleie. ⁽⁴⁴⁾	Öl.			Höl- als Furfurol. Venharz bei Destillation
51.	Fucusol $C_5H_4O_2$.	Schwefels. auf Fucusarten. ⁽⁴⁴⁾	Öl. farblos.			171° 172°
52.	Furfuracrolein $C_4H_3O.CH:CH.CHO$.	Acetaldehyd u. Natronlauge auf Furfurol (H.). ⁽⁵⁵⁾		farblose Nadeln.	51°.	Über 200° (teilweise) zerfällt in Wasser leicht flüchtig
53.	Furfurcrotonaldehyd $C_4H_3O.CH:CH.CH_2CHO$. od. $C_4H_3O.CH:C(CH_3).CHO$.	Propylaldehyd u. Natronlauge auf Furfurol (H.). ⁽⁶¹⁾	Öl, schw. gelblich, an der Luft braun werdend, u. verharzend.			unlöslich, vermindert Druck, unzersetzt destilliert, Wasser leicht flüchtig 186°
54.	Furfurbutylenoxyd $C_4H_3O.CH.C(CH_3)_2$. 	Zinn u. Salzs. auf Furfurbutylen und salpetrige Säure. ^(9, 10)	Flüssigkeit.	Ligroin: gelbe, glänzende Nadeln.		
55.	Chlorfurfuracrolein $C_4H_3O.CH:C(Cl).CHO$.	Monochloracetaldehyd auf wssr. Lös. v. Furfurol. ⁽¹⁴¹⁾		farblose Nadeln od. Blätter.	79°.	leicht flüchtig
	Phenylhydrazid.			gelbe Blättchen.	c. 157° zersetzt.	
	Aldoxim.			kleine Nadeln.	164 bis 165°.	bei 14° sublimiert


Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
Wasser	Alkohol	Äther	u. s. w.	Farbenreaktion	Andere	
				Konz. Schwefels. od. Salzs. färben purpurrot.	Salpeters. = eine der Oxypikrins.ähnliche Säure.	
14 Tl. (k)				färbt sich mit Schwefels. grünlich-braun; m. Salpeters. hellgelb, u. Kalilauge gelb, dann rot.	Silberoxyd oxydiert zu β -Pyroschleims. ⁽⁶⁰⁾	Sp. G. 1,150. (13,5°).
mt-m-ch.	h.: l. k.: sch.	1.	1.	färbt eine Lös. von Anilin in Eisessig grün, beim Stehen braunrot.	Silberoxyd u. Wasser (H.) = Furfuracyls.	
mt-m-ch.						
	1.					
te-end.	h.: lösl.	lösl.	Benzol, Chloroform: lösl.	Konz. Schwefels. färbt grün; salzs. Anilin desgl.; geht in rotbraun über.	Reagiert als Aldehyd.	
	h.: lösl.	lösl.	Benzol Chlorof.: lösl. Ligroin: sch.			

No.	N a m e	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siede-
56.	Pyroschleimsäure $C_4H_3O.CO_2H.$	1. (H.) auf Schleims. — 2. Silberoxyd auf Furfurol. ⁽⁵⁶⁾ — 3. Alk. Kali auf Furfurol — desgl. wssg. Kali. ⁽⁹⁸⁾	farblose Nadeln od. Blätter.	143,3°. (56)	sub- limier- bei 10
	$C_5H_3O_3K.$	(29)	luftbestän- dige glän- zende Schuppen.		
	$C_5H_3O_3Na.$		Krystall- schuppen.		
	$C_5H_3O_3(NH_4).$	(64)	gut krystalli- sierend.		
	$(C_5H_3O_3)_2Ba.$	(56)	Kryställ- chen.		
	$(C_5H_3O_3)_2Cr.$				
	$(C_5H_3O_3)_2Ca.$	(29)	krystalli- nisch.		
	$C_5H_3O_3Ag.$	(64, 56, 66)	weiße Krystall- blättchen.		
	$(C_5H_3O_3)_2Cu + 3aq.$	(64, 29)	blaugrüne Kryställ- chen.		
	$(C_5H_3O_3)_2Pb + 2aq.$	(29)	weiße, harte Krystalle.		
	Aethylaminsalz	(75)	krystalli- nisch erstar- rend, sehr hygro- skopisch.	100°	

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. w.	Farbenreaktion	Andere	
	28 Tl. (15°) 4 Tl. 100°	1.			Eisenchlorid giebt rotgelbe Nieder- schläge. ^(4, 72)	Chlor (K.) bildet Muc- chlors. ^(29, 73) Brom (K.) bildet Mucobroms. ^(29, 4) Trocknes Brom bildet Tetrabromid. ⁽⁷⁴⁾ Brom auf Eisessiglös. bildet δ-Monobrom-Pyro- schleims. ⁽²¹⁾ 2 Mol. Brom (K.) bilden Fumars.alde- hyd (beim Verdampfen Fumars. ^(4, 21) daneben C ₄ H ₃ BrO ₂ ; durch Na- triumamalgam daraus C ₄ H ₄ O ₂ : Flüssigkeit, Benzolgeruch, schwerer als Wss. ⁽⁴⁾ Beim Er- hitzen unter Kalk. Chlor- zink u. Anilin entsteht α-Naphtylamin. ⁽¹²⁵⁾	Bleiessig fällt basisches Salz. Die Alkalisalze fallen Zinn u. Quecksilber oxy- dulsalz weifs. ⁽⁶⁴⁾ (Vgl. 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71.)
	1.	1.				Beim Erhitzen entsteht Pyroschleims. u. Am- moniak.	
	1.						
	k.: sch.						
	k.: sch.						

No.	N a m e	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siedepunkt
	Aethylester.	1. Salzs. auf alk. Lös. von Pyroschleims. ^(56, 76 s. a. 68) 2. Alk. Cyankaliumlös. auf Futil. ⁽²⁷⁾	blättrige Kryst.	34°.	208 bis 210°.
	Chlorid.	Phosphorpentachlorid auf die Säure (H.). ^(4, 77)	Öl, stark lichtbrechend.		170°.
	Cyanid $C_4H_3O.CN.$				
	Amid.	Ammoniak auf das Chlorid oder den Ester. ^(56, 75, 77, 78)	grofse Blätter.	142 bis 143°.	sublimiert 258°.
	Aethylamid.	Äthylamin auf den Ester. ⁽⁷⁵⁾	Öl, dick, farblos.		
57.	β-Pyroschleimsäure $C_5H_4O_3.$		Wss.: rhomb. Blättchen.	130°.	
	$(C_5H_3O_3) Ag.$	Silberoxyd auf Fucusol. ⁽⁶⁰⁾	Wss.: lange, flache Nadeln.		
58.	Isopyroschleimsäure $C_5H_4O_3.$	(Nebenprodukt bei der Destillation der Schleims.	weifse Blättchen.	82°. (70° erweicht).	sublimiert unter 100°.
	Pyromekonsäure $C_5H_4O_3.$	s. Pyroschleimsäure.			
59	Pyrotritisäure Uvinsäure; Dimethylfurfurancarbonsäure $C_4HO(CH_3)_2CO_2H.$	(H.) auf Weins. ⁽⁸²⁾ 2. auf Carbopyrotritis. ⁽⁸³⁾ 3. Barytwss. auf Brenztraubens. (H.) ^(84, 85) 4. Natriumacetat und Essigs. anhyd. auf Brenztraubens. (H.) ⁽⁸⁶⁾ 5. (H.) auf Metrons. ⁽¹³⁵⁾	Wss.: farbl. glänzende Nadeln. Ath.: kurze, derbe Säulen.	135°.	sublimiert unter 135°. Wssd. flüchtig.
	$(C_7H_6O_3)_2Na + 2H_2O.$	(83)	stralig vereinte Nad.		
	$(C_7H_7O_3)_2Ca + 4H_2O$ (+ $3H_2O.$)	(84)	Undeutl. Drusen.		
	$(C_7H_7O_3)_2Ba + 4H_2O$ (+ $5H_2O.$)	(153)	Runde Drusen.		
	$(C_7H_2O_3)_2Zn + 4H_2O.$	(153)	durchsichtige Prismen.		

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. W.	Farbenreaktion	Andere	
ähnlich dem Benzoylchlorid.		k.: l.					Beim Chlorieren unter Druck entstehen Nebenprodukte. ⁽⁴⁾
	sch.	l.				Phosphorpentachlorid bildet $C_4H_3OCCl_2NH_2C_2H_5$.	
	l.	l.	l.		Eisenchlorid färbt tiefgrün, wird beim Kochen rotbraun; Barytwss. (H) tiefrot.	In der wssg. Lös. entsteht durch Brom neben Brom ein krystall. Nebenprodukt Schmelzp. 220°. Übersch. Barytwss. fällt voluminösen Ndschl.	Ähnelt sehr der Pyroschleims.
	k.: sch. h.: sch.	l.	l.		Mit Salzs. u. Schwefels. kirschrothe Färbg. ⁽⁸³⁾	Wss. spaltet in Acetonylaceton und Kohlens. — Chroms. oxydiert zu Essigs. und Kohlens.; Salpeters. zu Oxals. u. Kohlens. ⁽⁸⁷⁾	
	k.: sch.						

No.	N a m e	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siedepunkt
	Aethylester	1. Jodäthyl auf das Silbersalz (H.). ⁽⁸³⁾ — 2. Schwefels. auf Diacetybernsteinsäureäther (H.) — 3. Salzs. auf Acetonylacetessigäther. ⁽¹³⁾	Öl, schw.		208 bis 209 ⁰
60.	Furfurpropionsäure $C_4H_3O \cdot CH_2CH_2CO_2H$.	Natriumamalgam auf Furfuracrylsäure. ⁽²⁸⁾	Äth.: farbl. krystallin.	50—51 ⁰	229 ⁰ (148)
	Amid.	Erhitzen des Ammoniaksalzes	Ligroin: wisc. Nad.	98 ⁰	270 ⁰
61.	Furfuracrylsäure $C_4H_3OCH:CHCO_2H$.	1. Essigs.anhyd. Natriumacetat auf Furfurol (H.) ^(28, 148) — 2. Silberoxyd auf Furfuracrolein. ⁽⁵⁵⁾	Wss.: lange, spröde, farbl. Nadeln.	135 ⁰ 140 ⁰ (148)	unzer- setzt flüchtig; Wssd. 226 ⁰ (148) s. a. ⁽¹⁴⁹⁾
	Ester.	Alkoh. u. Schwefels. auf Furfurpropions. ⁽¹⁵⁰⁾	farbloses Öl.		228 bis 230 ⁰
62.	Furfurcrotonsäure $C_8H_5O_3$.	Silberoxyd auf Furfurcrtonaldehyd.	feine Nad.	107 ⁰	sublimiert
63.	Furfurangelicasäure $C_4H_3O \cdot CH < \begin{smallmatrix} CH_2CH_3 \\ CO_2H \end{smallmatrix}$	N. butters. Natron u. Normalbutters.anhyd. auf Furfurol. (H) ^(9 s. a. 90) .	farbl., glzd. Nadeln.	87—88 ⁰	
64.	Furfurvaleriansäure $C_4H_3O \cdot CH_2 \cdot CH < \begin{smallmatrix} C_2H_5 \\ CO_2H \end{smallmatrix}$	Natriumamalgam auf Furfurangelicas. (H) ^(9,91) .	Öl, farblos.		unzer- setzt destillb.
65.	Cumarilsäure  $C_6H_4 < \begin{smallmatrix} CH \\ O \end{smallmatrix} > CCO_2H$.	Alk. Kali auf Cumarondibromid (H.) ⁽¹²⁶⁾ oder Chlor- oder Bromcumarin	Alk.: Nadeln.	190 bis 191 ⁰ 192 bis 193 ⁰	310 bis 315 ⁰
	$(C_9H_5O_3)_2 Ba$. $(C_9H_5O_3)_2 Ca$. $(C_9H_5O_3) Ag$.		Blättchen. kl. Nadeln. weißes Pulver.		

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. w.	Farbenreaktion	Andere	
anis- artig.							
zimmt- artig.	l.		l.		Konz. Salzs. löst gelb.	Brom bildet in der wss.gen Lös. Furoin- säurealdehyd. (leicht zer- setzlich, krystallis.)	Über ein Re- aktionsprodukt von HCl auf die alk. Lös. s. ⁽¹⁴⁸⁾ u. ⁽¹⁵⁰⁾
	l.	l.	l.				
zimmt- artig.	k.: sch. h.: l.	h.: l.		Eisessig, Benzol: l.; Ligro- in, Schwe- felkohlen- stoff.: sch.	Konz. Salzs. u. Schwefels. lösen grün.		Durch Ein- wirkung von Brom entstehen Krystalle $C_7H_5Br_3O_3$, die von Wss. zersetzt werden s. ⁽¹⁴⁷⁾ Alkali- u. Kalk- salz l. lösl.; andere: sch. lösl.
	n.	l.	l.				
erstik- kend.						In der Kalischmelz. entsteht Essigs. und Salicyls.	Mit Blei- u. Quecksilbersalzen fallen weisse. mit Eisenoxyd- salzen braune Ndsch.

No.	N a m e	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siedepunkt
66.	Hydrocumarilsäure $C_9H_8O_3$.	Natriumamalgam auf Cumarils. ⁽¹²⁶⁾	Perlmutterglänzende Blättchen.	116,5°	298° 300,5° theilw. zersetzt.
	$C_8H_7OCO_2(C_2H_5)$.		Krystalle.	23°	273°
	$(C_9H_7O_3)Ba + 2H_2O$.		tafelförm. Kryst.		
	$(C_9H_7O_3)Ca + 2H_2O$.		tafelf. Kryst.		
67.	β-Methylcumarilsäure $C_8H_4O \cdot CH_3 \cdot CO_2H$.	Verseifung des Esters.	Alk.: federartige Nad. od. kurze Prismen.	188 bis 189° (zer- setzt)	sublimier- bar.
	$C_{10}H_7O_3 \cdot K + H_2O$.		Dünne glzd. Nadeln.		
	$C_{10}H_7O_3(NH_4) + H_2O$.		Rosetten- artig grupp. Nadeln.		
	$(C_{10}H_7O_3)_2Ba + 3H_2O$.		Glzd. Kryst.		
	$C_{10}H_7O_3Ag$.		Mikroskop. Prismen.		
	Aethylester.	Chloracetessigester auf Phenolnatrium u. Schwefels. auf den entstanden. Phenoxylacetessigester. (11, 17)	Benzol: rhombische Tafeln.	51°	290°
	Amid.	Ammoniak a. d. Ester. ⁽¹³⁴⁾	Wss.: kleine Nadeln.	145°	
	Thiosäure.	s. Bem.			
68.	Phenylmethylfurfuran- carbonsäure $C_4HO \cdot CH_3 \cdot C_6H_5 \cdot CO_2H$.	Salzs. auf Dehydroaceto- phenonacetoncarbons. (H.). ⁽¹³⁾	Weisse glänzende Nadeln.	180 bis 181°	sublimiert bei 100°

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. w.	Farbenreaktion	Andere	
k: sch. h:l.							Durch Einwirkung von P_2S_5 auf den Ester entsteht: Methylthiocumarils.: gelbe Nadeln. Schmelzp. 90—91°. Von alk. Kali zur Säure regeneriert. ⁽¹³⁴⁾
						Wssg. Alkalien verändern nicht, alk. verseifen.	
						Alk. Kali regeneriert die Säure.	
		l.	l.	Sch.: Petrol- äth. l.: Benzol, Chloro- form.		Erhitzen mit Wss. auf 240—250°, Kochen mit Minerals., Destillieren über Zinkstaub spaltet Kohlens. ab und bildet Phenylmethyلفurfuran.	

No.	N a m e	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siedepunkt
69.	$\alpha\alpha$-Diphenylfurfuran-carbonsäure $C_4HO(C_6H_5)_2CO_2H$.	Salzs. auf Phenylacetylenbenzoylessigs. (H.) oder durch Verseifen des Esters mit verd. Säuren. (137)	Alk.: weisse Nadeln.	217°	Destilliert fast unzer- setzt.
	Natronsalz.		Alk.: büschelförm. vereinte Nadeln.		
	Aethylester.	Salzs. auf Phenacylbenzoylessigester und Alkohol (H.).(137)	Alk.od.Äth.: grofseKryst.	82°	
	$C_{17}H_{10}O_3K$.		Grofse, wss. freie Blätt.		
	$C_{17}H_{10}O_3(NH_4)$.		Lange Nadeln.		
	$(C_{17}H_{10}O_3)_2Ca$.		Kleine,feine verfilzte Nadeln.		
70.	Methyl-α-naphtofurfuran-monocarbonsäure $C_{12}H_6O.CO_2H.CH_3$.	Alk. Kali auf den Ester.(92)	Kryst., licht beständ. Pulver.		
			Mikroskop. Tafeln; Eis- essig: flache Nadeln.	243 bis 245° zersetzt.	Subli- miert z. Tl. unzer- setzt.
	Aethylester.	Chloracetessigester auf Naphtolnatrium u. Schwefels. auf das ent- standene Produkt.	Glzde.gelbe, grün fluores- cierende flache Nad.	108°	

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. w.	Farbenreaktion	Andere	
	n.	h.: l.	h.: l.	Petrol- äther u. Eisessig, Benzol, h: l.			Durch Oxydation entsteht Benzoe- säure.
							Das Nasalz giebt mit CaCl_2 , Mg- SO_4 , ZnCl_2 , Hg- Cl_2 , MnCl_2 , Ag- NO_3 weisse flockige Ndschl., die in h. Wss. un- lösl. sind; mit BaCl_2 weissen gallertartigen Ndschl. — FeSO_4 färbt rotbraun. Fe_2Cl_6 rot, Cu- SO_4 hellgrün.
	l.	l.	l.				Verliert über Schwefels. alles Ammoniak.
				sch.			
	sch.						
	sch.	sch.	sch.		Schwefels. giebt grüngelbe Lös., die i. H. grün, dann purpurrot. Wss. färbt grün, Alka- lien gelbbraun, Säuren wieder grün.	Zerfällt glatt bei der Destillation mit Kalk.	Salze, ausser den Kalisalzen sch. lösl. Die der Alkalien u. Erden Nadeln krystall., die übrigen amorph.
	h:l. k: sch.	l.					

No.	N a m e	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siedepunkt
71.	Methyl-β-naphtofurfuran-carbons. $C_{12}H_6O \cdot CH_3 \cdot CO_2H$. $C_{14}H_8NaO_3 + 4H_2O$.	Alk. Kali auf den Ester. ⁽⁹²⁾		253 bis 254°	
	Aethylester.	Chloracetessigester auf β -Naphtolnatrium u. Schwefels. auf das entstandene Produkt.	Glänzende, blau fluorescierend. Nad	100°	
72.	α-Chlorfurfuracrylsäure $C_4H_3O \cdot CH : CCl \cdot CO_2H$.	Silberoxyd auf den Aldehyd (H.). ⁽¹⁴¹⁾	Wss.: weisse Krystallbüschel.	142°	
73.	γ-Chlorfurfurpentinsäure $C_4H_3O \cdot CH : CCl \cdot CH \cdot CH \cdot CO_2H$.	Natriumacetat u. Essigs-anhydrid auf α -Chlorfurfuracryls. (H.). ⁽¹⁴¹⁾	Alk.: hellgelbe Nadeln.	c. 168°	
74.	Dichlorpyrotritar-säure $C_7H_6Cl_2O_2$.	Phosphorpentachlorid od. Phosphoroxychlorid auf Pyrotritar. (H.). ⁽⁸⁾	Öl, gelb.		230 bis 235° (verharzt).
75.	$\alpha\alpha$-Dichlorbrenzschleim-säure $C_5H_2Cl_2O_3$.	Alk. Natron auf Tetrachlorbrenzschleims. ⁽¹²⁹⁾	Wss.: lange, verfilzte Nadeln.	168 bis 169°	

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. w.	Farbenreaktion	Andere	
					Konz. Schwefels. färbt blau (h.)		
	h: lösl.	lösl.	lösl.	Benzol, Chloroform, lösl. Ligno:n:n.		Konz. Schwefels. färbt rot; Wss.zusatz gelb.	Das Am.salz giebt Niederschläge mit CuSO_4 grün, $\text{Pb}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2$ weifs, AgNO_3 weifs, Fe_2Cl_6 braun, LiSO_4 weiss. — Die Erdalkalisalze sind in Wss. leicht lösl.
	lösl.	lösl.	lösl.	Benzol, Chloroform, lösl. Ligno:n:n.		Konz. Schwefels. färbt rotbraun, in rotviolett übergehend.	Das Ammonsalz giebt Niederschl. mit CuSO_4 grün; AgNO_3 weifs; FeSO_4 gelblich; $\text{Pb}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2$ hellgelb. Die Alkali- u. Erdalkalisalze sind in Wss. l. lösl.
stechend.	n.			mit den üblichen Lös.mitteln mischbar.		An der Luft entsteht Pyrotritar. u. tritt Verharzung ein; Alkali, Jodwss.stoff u. Phosphor verharzen. Jodkalium u. Silber od. Kupfer bilden den Aethylester der Pyrotritar., ebenso Natriumamalgam.	
	h:1	l.	l.	Chloroform, Benzol h:1		Mit Brom entsteht (?) Dichlorbrombrenzschleims.; wssg. Brom bildet Mucochlors. — Salpeters. oxydiert zu Mucochlors. u. Dichlormaleins.	

No.	N a m e	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siedepunkt
	$(C_5HCl_2O_3)_2Ba + 3H_2O$.		Feine Nadeln.		
	$(C_5HCl_2O_3)_2Ca + 4H_2O$.		Lange Nadeln.		
	$C_5HCl_3O_3Ag$.		Feine Nadeln, kleine Prismen.		
	$C_5HCl_2O_3(C_2H_5)$.		Feine Nadeln.	63—64°	
	Amid.		Feine Nadeln.	176°	
76.	Pyroschleimsäureäthylestertetrachlorid $C_5H_3Cl_4O_3 \cdot C_2H_5$.	Trocknem Chlor auf den Pyroschleimsäureäthylester ⁽⁶⁹⁾	Flüssigkeit, farblos.		Nicht destillierbar
77.	δ-Monobrompyroschleimsäure $C_4H_2BrO \cdot CO_2H$.	1. (H) auf das Pyroschleimsäuretetrabromid. ⁽⁷⁴⁾ — 2. konz. alk. Kali auf Pyroschleimsäureesterdibromid. ^(76, 20) — 3. Brom auf Pyroschleims. in konz. Eisessiglös. ⁽²¹⁾ NB. Nach 2.) entsteht eine zweite Monobrompyroschleims., Schmelzp. 156—157, die beim Kochen mit salzhaltigem Wss. in die δ-Säure übergeht; ⁽⁷⁴⁾ vergl. dagegen ⁽²⁰⁾	Wss.: perlmutterglzd. Blättchen.	183 bis 184° ⁽²¹⁾	
	$C_5H_2BrO_3K$.	(18)	Flache Prismen.		
	$C_5H_2BrO_3Na$.		Konzentrisch gruppiert. Nad.		
	$(C_5H_2BrO_3)_2Ba + 4H_2O$.		Blättchen.		
	$(C_5H_2BrO_3)_2Ca + 3H_2O$.		Kugelförmig gruppierte Prismen.		
	$(C_5H_2BrO_3)Ag$.		Tafeln.		

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. w.	Farbenreaktion	Andere	
k: sch.							
h: l.							
sch.							
		Misch- bar.				Ammoniak auf die alk. Lös. giebt unter Kohle- abscheidung Chlor- ammonium u. Cyanam- monium	Geschmack: bit- ter, brennend. Sp. G. 1,496 (15°).
k: sch. s. ⁽¹⁸⁾						Brom auf die in Wss. verteilte Säure: (K.) Fumars., die auch beim Erhitzen mit verd. Schwefels. entsteht.	Brom-Additions- produkt C_4H_2 $Br_5O \cdot CO_2H$. Schmelzp. c. 170° (zersetzt).
l.							

No.	N a m e	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siedepunkt
	$C_5H_2BrO_3(C_2H_5).$	Schwefels. auf die Säure und Alk. (H.).		17°	253° (767mm) 133 bis 134° (31mm) 132° (20mm)
	$C_5H_2BrO_3(C_2H_5)Cl_2.$	Salzs. auf die Säure in alk. Lös.	Öl.		
	$C_5H_2BrO_2NH_2.$	Ammoniak auf den Äthylester.	Lange Nadeln.	144 bis 145°	
78.	β-Monobrompyroschleimsäure $CH:CH \begin{smallmatrix} & O \\ & \diagup \end{smallmatrix}$ $\dot{C}Br:C.CO_2H.$	Zink auf die beiden Dibrompyroschleims. in ammoniakalisch. Lös. ⁽²⁰⁾	Wss.: feine verfilzte Nadeln.	128 bis 129°	
	$C_5H_2BrO_3K.$	(18)	Rechtwinkl. Tafeln.		
	$C_5H_2BrO_3Na.$		Kugelige Aggregate.		
	$(C_5H_2BrO_3)_2Ba + H_2O.$		Blättchen.		
	$(C_5H_2BrO_3)_2Ca + 3H_2O.$		Konzentrisch gruppirte Nadeln.		
	$C_5H_2BrO_3C_2H_5.$		Konz. grupp. Nadeln.	28—29°	235° (768mm)
	$C_5H_2BrO_2NH_2.$	Ammoniak auf den Äthylester.	Feine Nadeln.	155 bis 156°	
79.	Bromcumarilsäure $C_9H_5BrO_3.$	Alk. Kali auf Bromcumin (H.). ⁽¹²⁶⁾	Alk.: Nadeln.	>250°	

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. w.	Farbenreaktion	Andere	
							V. G. 1, 528 (20°).
	h: l.	l.	l.	Sch.: Schwefelkohlenstoff, Benzol; l: Chloroform.			
	k: l.	l.	l.	Sch.: Chloroform, Benzol, Ligroin.		Verd. Schwefels.(H): Monobromfumars. Schmelzp. 176—177°. — Salpeters.: Fumars.-Brom: Mucobroms.	
	l. Zahlen (20)						
	l. Zahlen (20)						
		l.	l.	Sch.: Schwefelkohlenstoff, Benzol, Ligroin; l: h. Chloroform.			
sch.	l.					Kali zersetzt.	Die Salze ähneln denen der Cumarils.

No.	N a m e	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siedepunkt
80.	$\beta\gamma$-Dibrompyroschleimsäure CBr:CH $\quad \quad \quad \text{>O}$ $\text{CBr:C.CO}_2\text{H.}$ $\text{C}_5\text{HBr}_2\text{O}_3\text{K.}$ $\text{C}_5\text{HBr}_2\text{O}_3\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O.}$ $(\text{C}_5\text{HBr}_2\text{O}_3)_2\text{Ba} + 3\text{H}_2\text{O.}$ $(\text{C}_5\text{HBr}_2\text{O}_3)_2\text{Ca} + 5\text{H}_2\text{O.}$ $\text{C}_5\text{HBr}_2\text{O}_3\text{Ag.}$ $\text{C}_5\text{HBr}_2\text{O}_3\text{C}_2\text{H}_5.$ $\text{C}_5\text{HBr}_2\text{O}_2\text{.NH}_2.$	Agentien auf das Kalksalz.(18. 20. 74) Pyroschleims.tetrabromid in alk. Lös auf alk. Natron (K.).	Wss.: kleine, sternförmig grupp. flache Nadeln. Flache Prismen. Seideglzd. Nadeln. Flache, conv. grupp. Nadeln. Nadelbüschel. Nadelbüschel. Feine Prism. Glänzende Nadeln.	192° 67—68°	
81.	$\beta\delta$-Dibrompyroschleimsäure CH:CBr $\quad \quad \quad \text{>O}$ $\text{CBr:C.CO}_2\text{H.}$ $\text{C}_5\text{HBr}_2\text{O}_3\text{K.}$ $\text{C}_5\text{HBr}_2\text{O}_3\text{Na.}$	1. Agentien auf das Kalksalz.(20) 2. Brom auf trockene Pyroschleims.(18) s. ob.	Wss.: kleine, schiefe Prismen. Konz. grup. Nadeln. Kurze Nadeln.	167 bis 168°	

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. w.	Farbenreaktion	Andere	
k: sch. Zah- len s. (20)	1.	1.	Sch.: Schwefel- kohlen- stoff. Ligroin; l.: Benzol. Chloro- form (h).			Verd. Salpeters. (H): Mucobroms. u. Dibrom- maleins. Bromwss. (K.): Dibromfumars.aldehyd (Tetrabromfurfuran). (H): Mucobroms. (20. 93)	
L. s. (20)				s. (20)			
l. h: sch.	1. 1.	1. sch.	Sch.: Schwefel- kohlen- stoff, Ligroin, Chloro- form, Benzol.			Brom: Tetrabromfurfuran u. Dibrommaleinsäure- aldehyd.	
			Ähnlich d. vorig. s. (18. 20).			Verd. Salpeters. (H): Monobromfumars. Brom: Monobrommaleinsäure- dibromid.	

No.	N a m e	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siedepunkt
	$(C_5HBr_2O_3)_2Ba + 4H_2O.$		Fein verzweigte Nadeln.		
	$(C_5HBr_2O_3)_2Ca + 3H_2O.$		Konz. grup. Prismen.		
	$C_5HBr_3O_3Ag.$		Nadelbüschel.		
	$C_5HBr_2O_3(C_2H_5).$		Büschel flacher Nadeln.	57—58°	271 bis 272° (765mm)
	$C_5HBr_2O_2NH_2.$	Ammoniak auf den Ester.	Seideglänzende Nadeln.	175 bis 176°	
	$C_5HBr_2O_2Br.$	Brom auf Brenzschleims. (H.).	Prismen.	45—46°	153 bis 155° (124mm)
	$C_5H_3Br_2O_3 \cdot C_2H_5.$	Brom auf Pyroschleimsäureäthylester in Eisessiglös. ⁽⁷⁶⁾	Öl, gelb.		
82.	Pyroschleimsäureäthylester-Tetrabromid $C_5H_3Br_4O_3 \cdot C_2H_5.$	Brom auf Pyroschleimsäureäthylester. ⁽⁷⁴⁾	Chloroform: farblose Krystalle.	46—48° (darüber Zersetzung).	
83.	Tribrompyroschleimsäure $C_4Br_3OCO_2H.$	Alk. Kalilauge auf das Bromadditionsprodukt der δ -Monobrompyroschleims. ⁽²⁰⁾	Wss.: kleine, sternförmig grup. Nadeln.	218 bis 219°	
	$C_5Br_3O_3K + H_2O.$		Kugelförmig grup. Ndl.		
	$C_5Br_3O_3K + H_2O.$		Wollige Nadeln.		

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. w.	Farbenreaktion	Andere	
				s. (18, 20)			
		sch.	sch.	s. (20)			
		k: sch. h: l.	l.	Sch.: Schwefel- kohlen- stoff. l.: Chloro- form. Li- groin. Benzol.			
		l.	l.	Sch.: Schwefel- kohlen- stoff, Li- groin. l.: Chloro- form. Benzol.			
		l.	l.				
						Reductionsmittel bilden bromfreien Ester.	
						Verd. Salpeters. (H.): Dibrommaleins. Wssg. Brom: Tetrabrom- furfuran.	
	h: sch. s. (20)	l.	l.				

No.	N a m e	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siedepunkt
	$(C_5 Br_3 O_3) Ba + 3H_2O.$ $(C_5 Br_3 O_3) Ca + 4H_2O.$ $C_5 Br_3 O_3 Ag.$ $C_5 Br_3 O_3 C_2 H_5.$		FeineNadeln. Nadelbüschel. Krystallinisch. Rechtwinklige Prismen.		
	$C_5 Br_3 O_2 NH_2.$	Ammoniak auf den Äthylester.	FeineNadeln.	222 bis 223°	
84.	Pyroschleimsäuretetra- bromid $C_5 H_4 Br_4 O_3.$	Brom auf Pyroschleims. (H.). ⁽⁷⁴⁾	Äth.: farblose Kryst.	159 bis 160° (zer- setzt).	
85.	Tetrabrompyrotritar- säure $C_6 H_3 Br_4 O. CO_2 H.$	Brom auf Pyrotritar. (H.). ⁽¹²¹⁾	Benzol: zugespitzte, verwitternde Prismen. (benzolhaltig). Chloroform: büschelförmig vereinte, verwitternde Nadeln. (chloroformhaltig).	161 bis 162°	
86.	δ-Brompyroschleimsäure- tetrabromid $C_5 H_3 BrO_3 Br.$	Brom auf δ-Brompyroschleims. (H.). ⁽¹⁸⁾	FeineNadeln.	Ohne zu schmelzen bei 173° zersetzt	

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. w.	Farbenreaktion	Andere	
				s. (20) s. (20)			
		h: sch.	l.	Sch.: Li- groin; l.: Schwefel- kohlen- stoff, Chloro- form, Benzol.			
		h: l. sch.		Sch.: Schwefel- kohlen- stoff, Li- groin, Chloro- form, Benzol.			
		l.	l.	Sch.: Chloro- form, Li- groin.		Wss. (H): Kohlens. u. Brom- wss. stoff. Verd. Chroms.: Dibrombernstein- säure. — Reduktions- mittel: Pyroschleims.	
	n.	l.	l.	N.: Li- groin. l.: Ace- ton, Essigs. Chloro- form, Benzol, Schwefel- kohlen- stoff.		Basen entziehen Brom. Natriumamalgam regene- riert die Säure. Jod- kalium u. Silber erzeugen eine amorphe Säure.	Salzeunbeständig.
Zer- setzt.	l.	l.				Salpeters. (H): Maleins. resp. Fumars.	

No.	N a m e	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siedepunkt
87.	Pentabrompyrotritar-säure $C_6H_3Br_5O.CO_2H.$	Brom auf Tetrabrompyrotritar. (H.). ⁽¹²¹⁾	Ligroin u. Chloroform: rhomboëder-ähnliche, glänzende Krystalle.	197° (190° Erweichung.)	
88.	Tetrabrompyrotritar-säuretetrabromid $C_6H_3Br_5O.CO_2H.$ Pyroschleimsäurenitril.	Tetrabrompyrotritar. auf Brom. ⁽¹²¹⁾ Phosphorpentachlorid od. Phosphors.anhydrid auf Pyroschleims.amid (H.). ^(75, 78) — s. a. No. 56.	Chloroform: kurze Prismen. Flüssigkeit, farblos, (Luft braun).	168 bis 170°	147°
89.	Nitropyroschleimsäure $C_4H_2(NO_2)O.CO_2H.$ $(C_5H_2NO_5)_2Ba.$ $(C_5H_2NO_5)_2Ca.$ $(C_5H_2NO_5)_2Pb.$ $C_5H_2NO_5Ag.$ Aethylester.	1. Konz. Salpeters. u. Schwefels. auf $\alpha\alpha$ -Dehydroschleims. (H.). ⁽⁸¹⁾ 2. Chroms.mischung auf Nitrofurfurnitroäthylen ⁽²³⁾	Wss.: hellgelbe rechtwinklige Tafeln. Hellgelbe Blättchen. Nadelbüschel. Amorph. Nderschl.	183°	Fast unzersetzt sublimierbar
90.	p-Nitromethylcumarilsäure $C_8H_3(NO_2)O.CH_3.$ $CO_2H + H_2O.$ $C_{10}H_6NO_5Ag + \frac{1}{2}H_2O.$	Alk. Kali auf den Ester. ⁽¹⁴⁾	Kurze, gelbe Nadeln. Wss.: feine, kurze, lichtempfindliche Nadeln.	178°	

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. w.	Farbenreaktion	Andere	
Bittermandelartig.						Natriumamalgam regeneriert die Säure.	Salzeunbeständig.
						Kalilauge(H): Pyroschleims. u. Ammoniak.-Zink u. Schwefels.: Furfurylamin.	Schwerer als Wss. Geschmack süßl.
	sch.	l.	l.			Zinn u. Salzs.: Bernsteins., Kohlens., Ammoniak.	
	k: sch.						
	l.	l.	l.				
				L.: Essigs.			
	sch.			L.: Ammoniak, Salpeters.		Wss. zersetzt teilweise unter Silberabscheidung. Verpufft beim Erhitzen.	
						Schon durch h. Wss. verseift.	
	sch.	sch.	sch.		Konz. Schwefels. (H.) braunrote Färbung.	m-Nitrophenol: m-Nitromethylcumarils. ester, weisse Nadeln. Schmelzp. 70°.	Kupfer erzeugt grünen, Kobaltnitrat rosa, Eisenchlorid gelblichen Ndschl.; Blei-, Mercur-, und Mercurisalze weisse Niederschl.
	sch.	sch.	sch.				

No.	N a m e	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siedepunkt
	$C_{10}H_6NO_5 \cdot C_2H_5$.	p-Nitrophenolnatrium auf Chloracetessigester u. Schwefels. auf das so erhaltene Produkt (? p-Nitrophenoxylacetessigester)	Büschelförmig vereinigte weiße Nadeln.	74°	
91.	β-Brom-δ-Nitropyroschleimsäure $C_4NO_2HBrO \cdot (CO_2H) + H_2O$.	β -Brom- δ -sulfo-pyroschleims. auf rauch. Salpeters.(142)	Wss.: büschelförmige Nadeln.	159 bis 160° (wasserfrei).	
92.	β-Sulfo-pyroschleimsäure $C_4H_2OHSO_3 \cdot CO_2H(?)$ $C_5H_2SO_6Ba + H_2O$.	Zinkstaub in ammoniakalisch. Lös. auf die aus der δ -Brompyroschleims. entstehende Sulfons.(94)			
93.	δ-Sulfo-pyroschleimsäure $C_4H_2OSO_3H \cdot CO_2H$. $C_5H_2SO_6Ba + 4H_2O$. $C_5H_2SO_6Ca + 3H_2O$. $C_5H_2SO_6Pb + 2H_2O$. $C_5H_2SO_6Ag$. $C_5H_2SO_6K_2 + 4H_2O$. $C_5H_2SO_6Na_2 + 5H_2O$. $C_5H_3SO_6Na + H_2O$. Amid.	1. Pyroschleims. auf rauch. Schwefels. (94.142) — 2. Schwefels.anhydrid auf Pyroschleims.(56) — Zinkstaub in ammoniakal. Lös. auf die aus $\beta\gamma$ -Dibrompyroschleims. entstehende Sulfons. (142) (142) (142) (142)	Kleine, konz. grup. Prismen. Gut ausgebildete, an feuchter Luft zerfließliche Prismen. Kleine, kugelförmig vereinigte Prismen. Kleine, konz. grup. Nadeln. Kleine Tafelchen.		
94.	Monobrom-β-Sulfo-pyroschleimsäure $C_4HBrO \cdot SO_3H \cdot CO_2H$ $C_5HBrSO_6Ba + 5H_2O$.	Rauchend. Schwefels. auf δ -Brompyroschleims.(94)	Wss.: lange Prismen. Lange, zerfließliche Nadeln.	213°	

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. W.	Farbenreaktion	Andere	
	l.	l.	l.			Alkali verseift.	
	h:l.						
						Brom auf die wssge. Lös. des Bariums Salzes (H.): Fumars. (s. a. 142)	Neutrale und saure Salze in Wss. lösl.
							Einwirkung von Brom s. ob.
	k: sch.						
	k: sch.					Zersetzen sich beim Er- hitzen mit Wss.	

No.	N a m e	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siedepunkt
95.	β-Brom-δ-Sulfo-pyroschleimsäure $C_4HBrO \cdot SO_3H \cdot CO_2H$. $C_5HBrSO_6Ba + 4H_2O$; $C_5HBrSO_6Ca + 6H_2O$; $C_5HBrSO_6Pb + 4H_2O$; $C_5HBrSO_6K_2 + 1\frac{1}{2}HO$.	Brompyroschleims. auf rauch. Schwefels. ⁽¹⁴²⁾	Wss.: strahlenförmige Nadeln.		
96.	Dibrom-δ-Sulfo-pyroschleimsäure $C_4Br_2O \cdot SO_3H \cdot CO_2H$. $C_5Br_2SO_6Ba + 5H_2O$.	Rauchend. Schwefels. auf $\beta\gamma$ -Dibrompyroschleims. ⁽⁹⁴⁾	Lange, feine verfilzte Nadeln.		
97.	$\beta\gamma$-Dibrom-δ-Sulfo-pyroschleimsäure $C_4Br_2O \cdot SO_3H \cdot CO_2H$. $C_5Br_2SO_6Ba + 5H_2O$; $PbC_5Br_2SO_6 + 4H_2O$; $Ag_2C_5Br_2SO_6 + H_2O$; $K_2C_5Br_2SO_6 + H_2O$.	$\beta\gamma$ -Dibrompyroschleims. auf rauch. Schwefels. ⁽¹⁴²⁾	Wss.: flache Prismen.		
98.	Furilsäure $(C_4H_3O)_2C(OH) \cdot CO_2H$.	Alkalien auf Furil (H.). ⁽²⁶⁾	Nadeln, feucht leicht braun, beim Umkrystallis. größtenteils zersetzt.		
99.	Benzfurilsäure $C_4H_3OC_6H_5 \cdot C(OH) \cdot CO_2H$.	Alkalien auf Benzfuril (H.). ⁽²⁶⁾	Farblose, kurze Prismen.	108°	Bräunung, höher zersetzt unter starkem Schäumen.
100.	Monobromfurilsäure $C_{10}H_7O_5Br$.	Alkalien auf Monobromfuril (H.). ⁽²⁶⁾			

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. W.	Farbenreaktion	Andere	
	1.					Einwirkung von Brom u. Salpeters. s. ⁽¹⁴²⁾	Das Ba.salz der entbromten Säure ist identisch mit dem der δ -Sulfo-pyroschleims.
						Brom auf die wssge. Lös. des Bariums Salzes: Dibrommaleins.	
	1.	1.	1.			Brom-Einwirkung s. ob.	
	1.					Einwirkung von Brom u. Salpeters. s. ⁽¹⁴²⁾ (Entstehung von Dibromnitro- u. Dibromdinitrofurfuran).	Durch Entbromen des Ba.salzes entsteht dasj. des auf direktem Wege erhaltenen Sulfo-pyroschleims.
	k: sch.	1.	1.	1.: Alkalien.		Zersetzt sich in wssge. Lös. schon bei 0°; Bräunung u. Abscheidg. eines braunen Harzes. — Alkalisch. Lös. viel beständiger.	
	sch.	1.	1.	sch.: Ligroin. 1.: Chloroform.	Konz. Schwefels. löst die kryst. Säure mit blutroter Farbe; das beim Verdunsten der ätherisch. Lös. zurückbleibende Öl mit rot-später blauvioletter Farbe.	Weniger unbeständig als Furils.	

No.	N a m e	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siedepunkt
101.	Dibromfurilsäure $C_{10}H_6Br_2O_5$.	1. Alkalien auf Dibromfural (H.). — 2. verd. Schwefels. auf das Bariumsalz. ⁽²⁶⁾			
	$(C_{10}H_5Br_2O_5)_2Ba$.	Barytlös. auf Dibromfural (H.).	Feine, weisse Nadeln.		
102.	m-Oxymethylcumarilsäure $C_8H_3(OH)O.CH_3$. CO_2H .	Alk. Kali auf den Ester ⁽³¹⁾	Wss.: Nadeln.	226° Kohlensäureentwicklg.	
	Aethylester.	Chloracetessigester auf Resorcinmononatrium.	Weisse Nadeln.	178°	
103.	m-Dioxymethylcumarilsäure $C_8H_2(OH)_2O.CH_3$. $CO_2H + \frac{1}{2}H_2O$.	Alk. Kali auf den Ester. ⁽¹⁵⁾	Krystalle.	281° (braun)	
	Aethylester.	Chloracetessigester auf Phloroglucin u. Natriumäthylat.	Warzenartige Nadeln.	242°	
104.	Dehydroschleimsäure (Furfurandicarbon.) $C_4H_2O.(CO_2H)_2$.	1. Überschüssig. Bromwasserstoff auf Schleims. (H.). ⁽⁷⁹⁾ 2. Salzs. auf Schleims. (H.). ⁽⁸⁰⁾ 3. Bromwasserstoff u. Salzs. auf Schleims. (H.). ⁽⁸¹⁾ — 4. (H.) auf die Schleims. ⁽⁸¹⁾ 5. Salzs. auf zuckers. Kali (H. Druck). ⁽¹⁵⁴⁾	Wss.: lange, seideglänz. Nadeln; Alk.: Blätter.		Sublimier. zum grössten Teil unzersetzt
	$C_6H_2O_5Ba + 2\frac{1}{2}H_2O$.	(79, 80, 154)	Farblose, büschelförmig vereinigte glzd. Nadeln; harte Prism.		
	$C_6H_2O_5Ba + 6H_2O$ $C_6H_2O_5Ba + 5H_2O$.	(154)	Weiche Ndl.		

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	n. s. w.	Farbenreaktion	Andere	
					Verd. Schwefels. auf die alk. Lös. (H.) fuchsinrot, Wss. fällt Farbstoff, der von Äth. rot, von Alkali gelb gelöst wird.		Ähnelt d. Furils.
	h: l.					Natriumalkoholat u. Chloracetessigester: m-Benzodimethyl- α - u. β -Difurfurandicarbon.	
	l.	sch.		n: Benzol.	Lös. fluoresciert.		
					Schwefels. giebt blaue Lösung. — Ebenso b. Ester. Alkalische Lös. fluoresciert.		Salze wasserlös.
	k: sch.	sch.	n.		Zeigt Isatinreaktion. ⁽¹⁵⁴⁾	Brom reagiert auf die trockene Säure nicht. ⁽⁸¹⁾ zerlegt aber eine h., wssg. Lös. in Fumars. u. Kohlens. Gemisch von Salpeters. u. Schwefels.: Nitropyroschleims. ⁽⁸¹⁾ Natriumamalgam u. Wss.: 2 Isomere $C_6H_6O_5$ Schmelzp. 146° resp. 173°. ^(79, 80) Destilliert: Pyroschleims. u. Kohlens.	Eisenchlorid giebt mit der wssg. Lös. eine durchsichtige Gallerte.
	h: l. k: sch.						

No.	N a m e	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siedepunkt
	$C_6H_2O_5Ca + 3H_2O.$	(79)	Farblose Blättchen od. Nadeln.		
	$C_6H_2O_5Ag_2.$	(79)	Weisse Ndschlg.		
	$C_6H_2O_5(C_2H_5)_2.$		Alk.: farbl. rhomb. Säulen.	47°	
	$C_4H_2(COCl)_2.$	1. Phosphorpentachlorid auf Dehydroschleims. (H.). ⁽⁸¹⁾ 2. Acetylchlorid auf Dehydroschleims. (H.)	Farblose, breite Nadeln.	80°	Sublimiert c. 100°
	$C_4H_2(CO.NH_2)_2.$	Ammoniak auf das Chlorid in ätherisch. Lös. ⁽⁸¹⁾	Farblose Nadeln.	> 240°	
105.	Furfuralmalonsäure $C_4H_3O.CH:C(CO_2H)_2.$	Alk. Kali auf den Ester u. Säurezusatz zu dem entstehenden Kalisalz.	Alkoh. od. Eisessig: derbe Prismen.	187° (Zersetzung.)	
	Monoäthylester.	Alk. Kali auf den Diäthylester u. Säurezusatz.	Benzol: grofse, durchscheinende, schwach gelbliche rhomb. Säulen.	102,5°	
	Diäthylester.	Malons.ester u. Furfuröl unter Zusatz von Essigsäureanhydrid (H.).	Schwachgelb dickflüssiges Öl; wird harzartig in der Kälte.		293° (Zer- setzt)

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. w.	Farbenreaktion	Andere	
	n.					Wird schwarz beim Kochen mit Wss.	
	k: sch. h: l.	sch.	sch.				
	l.	h: l.	l.	Eisessig h: l. Benzol, Chloroform: n.			Beim Erhitzen über den Schmelzpunkt Furfuracrylsäure. — Salze sind meist leicht lösl. — Ag.salz weifs, käsig; auch in h. Wss. nicht löslich.
	k: sch. h: l.			Benzol, Chloroform: l. Li- groin: n.			Bei der Destillation entsteht: Furfuracrylsäureester. Die Alkalisalze sind l. lösl.; die andern sch. Ag.salz: feine Nadeln; in Alk. sch. lösl.
Ätherisch.	n. mischbar.			Mischbar mit allen Lös., die sich mit Alkohol mischen.			

No.	Name	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siedepunkt
	Amid.	Ammoniak auf den Diäthylester. ⁽¹⁴³⁾	Alk.: feine weißse Ndl.	180° (Zersetz.)	
106.	Furfurylmalonsäure $C_4H_3OCH_2CH(CO_2H)_2$.	Natriumamalgam auf Furfuralmalons. u. Ansäuern. ⁽¹⁴³⁾	Äther: farblose Kryst. Alk.: lange Nadeln.	125°	
107.	Carbopyrotritisäure $C_8H_5O_5$. (Dimethylfurfurandicarbonsäure?)	Verd. Schwefels. auf den Diacetbernsteinsäureester (H.). ⁽⁸³⁾ (13.2)	Wss.: kleine zarte, wenig glänzende Nadeln.	230 bis 231° (Darüber zerfällt in Kohlens. u. Pyrotritis.)	
	$C_8H_6O_5K_2$. $C_8H_6O_5Ag_2$.	Alk. Kalilauge auf den Ester ⁽⁹⁵⁾	Feine, weiche Nadeln. Weißer, lichtempfindlicher Ndsch. (amorph. od. krystallinisch.		
	$C_8H_6O_5(C_2H_5)_2$.	Kalter, konz. Schwefels. od. heißer Phosphors. auf den Diacetbernsteinsäureester. ⁽⁹⁵⁾	Öl.		275,5° (735mm)
	$C_8H_7O_5Na + 3H_2O$.	(83)	Lange, glasglzd. Prism.		
	$C_8H_7O_5Ag$.	(83)	Flockiger, lichtbeständiger Ndschl.		
	$C_8H_7O_5(NH_4)$.	Ammoniak auf die Säure (H.).	Wss.: mikr. Ndl.		
	$C_8H_7O_5(C_2H_5)$.	1. (H.) auf den Diacetbernsteinsäureester. ^(83. 85) — 2. Salzs. auf den Diacetbernsteinsäureester (K.).	Blättchen. od. Nadeln.	83°	Unzer- setzt. Destil- lierbar.

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. w.	Farbenreaktion	Andere	
Välsrige lös., hat Frucht- geruch.	h: l.	h: l.	n.	Eisessig: l. Ben- zol, Li- groin, Chloro- form: n.			Salzs. verseift.
Ähnlich Hydro- zimmt- säure.	l.	l.	l.	Eisessig: l. Ligro- in, Ben- zol, Chlo- rof.: sch.			Bei der De- stillation: Fur- furpropionsäure. Salze sind meist lösl., aufser dem Silbersalz.
	k: sch.	l.	l			Schmelz. Kali giebt Essigs. u. Bernsteins. ⁽⁸³⁾ Natronkalk: flüchtiges Öl (Dimethylfurfuran?) — Wss.(H.): wssge. lösl. Körper. ⁽⁹⁵⁾	Neutrale Salze des Barium, Calcium, Blei, Kupfer, Uran, Nickel, Kobalt aus dem Kalium- salz in farblosen Kryst. erhalten. Saure Salze der- selben Basen u. des Quecksilbers aus dem Ammo- niumsalz als weisse, krystalli- sierbare Ndschl. (s. a. S. 8).
	k: sch.	l.	l.	l: Alka- licarbo- naten.			

No.	N a m e	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siedepunkt
108.	Diphenylfurfurandicarbon- säure $C_6H_5(CO_2H)_2$.	Verd. Schwefels. auf Dibenzoylbernsteinsäure- ester (H.). ^(95, 96)	Kleine Na- deln.	230° (zer- setzt)	
109.	o-Benzodimethyldifurfuran- dicarbonsäure $C_{14}H_{10}O_6$. ($C_{14}H_9O_6$) Ba + 2H ₂ O Aethylester.	Alk. Kali auf den Ester. ⁽¹⁴⁾ Dinatriumbrenzcatechin auf Chloracetessigester u. Behandeln mit Schwefels.	Gelblich- weifs. Pulv. Alk.: kurze Prismen.	155°	
110.	m-Benzodimethyldifurfuran- dicarbonsäure $C_{14}H_{10}O_6$. α-Aethylester. β-Aethylester.	Alk. Kali auf den Ester. ⁽³¹⁾ Chloracetessigester auf Resorcindinatrium. s. ob.	Mikrokry- stallinisch. Alk.: feine grünl. Ndln.	> 310° (zer- setzt).	
111.	p-Benzodimethyldifurfuran- dicarbonsäure $C_{14}H_{10}O_6 + H_2O$. ($C_{14}H_9O_6$) Ba + 2H ₂ O. $C_{14}H_9O_6Ag$. Aethylester.	Alk. Kali auf den Ester. ⁽¹⁴⁾ Chloracetessigester auf Hydrochinondinatrium.	Alk.: gelb- grüne, amorphe Massen. Gelblich- weifs. Pulv. Voluminöser Niederschlag.	hoch. 150°	
112.	Benzotrimethyltrifurfuran- tricarbonsäure $C_6(C_2O \cdot CH_3 \cdot CO_2H)_3$ + H ₂ O. Aethylester.	Alk. Kali auf den Ester. ⁽¹⁵⁾ Chloracetessigester auf Phloroglucintrinatrium u. Behandeln mit Schwefels.	Chloroform: weifse, glän- zende Na- deln.	296 bis 298° (zer- setzt)	
	($C_{18}H_{10}O_9$) Ba + 7H ₂ O.				

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. w.	Farbenreaktion	Andere	
	sch.	l.	l.	l: Benzol.	Konz. Schwefels. löst grün, (H.) grau.		Ähnelt der p-Benzodimethyldifurfurandicarbon.
				Alkali: n.			
	sch.	l.					Salze der α - u. β -Säure mit Metallsalzen weiß lösl. Ndsch.; Kupfersalz blau; Eisensalz grün.
				schwerer als β -Ester.			
	sch.	sch.	sch.				Salze außer denen der Alkalien sch. lösl.
	sch.	sch.	sch.			Alk. Kali verseift.	
	sch.	sch.	sch.				Salze unlösl., meist gelatinös.

No.	N a m e	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siedepunkt
113.	Thiofurfurol $C_5H_4OS.$	1. Schwefelammonium auf Furfurol. ⁽⁹⁷⁾ 2. Schwefelwasserstoff auf Furfuramid in alkalisch. Lös. ⁽⁹⁷⁾	Gelbliches, krystallinisch. Pulv.		
114.	Thiofucusol $C_5H_4OS.$	Schwefelwasserstoff auf Fucusamid. ⁽⁴⁴⁾			
115.	Seleniofurfurol $C_5H_4OSE.$	Selenwasserstoff auf Furfuramid in alkalischer Lös. ⁽⁹⁷⁾	Harzartig, leicht veränderlich.		
Gruppe C.					
116.	Furfuramid $(C_5H_4O)_3N_2.$	Wssg. Ammoniak auf Furfurol ^(46, 53)	Farbl. od. schwach gelbliche Nadeln.	117°	
	$C_{15}H_{12}N_2O_3 + CSN.C_3H_5.$	Allylsenföf auf Furfuramid in alk. Lös. (H.). ⁽⁵³⁾	Seideglnzd. Nadeln.	118° (c. 135° zer- setzt).	
	$C_{15}H_{12}N_2O_3 + CSN.C_6H_5 + H_2O.$	Phenylsenföf auf Furfuramid in alk. Lös. (H.).	Weisse Kry. beim Entwässern zersetzt.		
	$C_{24}H_{20}N_2O_4.$	Benzil u. Ammoniak auf Furfurol in alk. Lös. (H.). (Entstehung von 2 Isomeren.)			
117.	Furfurin. $(C_4H_5O)_2(CH)_2NH.N.C.$ $C_4H_5O.$	1. Kalilauge auf Furfuramid (H.). ⁽⁴⁶⁾ 2. (H.). auf trocknes Furfuramid. ⁽¹⁰¹⁾ 3. Ammoniak auf Furfurol (H.). ⁽¹⁰¹⁾ (s. a. 103)	Feine, weisse seideglzd. Nadeln. (trocken luftbeständig) od. kleiner rhombische Prismen. ⁽¹⁰⁴⁾	116° (53. 103)	
	$C_{15}H_{12}O_3N_2.HCl + H_2O.$	(46)	Seideglnzd. Nadeln.		

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. w.	Farbenreaktion	Andere	
						Erhitzen für sich oder⁽⁹⁷⁾ mit Kali: $(C_5H_4O)_x$: Aus Alk. lange, farbl. Nadeln. Schmelzp. 98°. Lösl. in Wss. (h.): sch. (Furfuranstillben?).⁽⁹⁾ Beim Erhitzen entsteht Pyrofucosol.	
	n.	l.	l.			Feuchte Luft, Wss. od. Alk. (H.), Säuren bilden Furfurol u. Ammoniak. — Verd. Kalilauge (H.): Furfurin,⁽⁴⁶⁾ ebenso durch Erhitzen auf 110—120°.⁽¹⁰¹⁾ Schwefelwasserstoff: Thiofurfurol.⁽⁹⁷⁾	
		l.					
	sch. Zahlen s. (14, 46)	l.	l.	L: Alk. Kalilauge; leuchtet mit Luft geschüttelt. ⁽¹⁰⁵⁾		Starke, einsäurige Base; Lös. alkalisch, in Siedhitze Ammoniak aus seinen Salzen ausgetrieben. In (K) wird es durch Ammoniak gefällt. — Wird in Furfurinlösung Kohlens. geleitet, so löst es sich, fällt aber beim Verdunsten unverbunden aus.⁽¹⁰⁶⁾	Salze, bitter, giftig. ⁽¹⁰⁷⁾
	l.						

No.	N a m e	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siedepunkt
	$C_{15}H_{12}O_3N_2 \cdot HCl$ $PtCl_4$.		Gelber kryst. Niederschl. ⁽⁴⁶⁾ od. lange Nadeln. ⁽⁴⁴⁾		
	$C_{15}H_{12}O_3N_2 \cdot HBr$.		Nadeln.		
	$C_{15}H_{12}O_3N_2 \cdot HJ + H_2O$.		Kleine, schief vier- seitige Prismen.		
	$C_{15}H_{12}O_3N_2 \cdot ClO_4H +$ H_2O .		Spröde, glasglzd. Prismen, ⁽¹⁰⁸⁾ rhombisch.		
	$C_{15}H_{12}O_3N_2 \cdot NO_3H$.		Alk.: grosse Prismen, (46, 44) rhom- bisch ⁽¹⁰⁹⁾		
	$C_{15}H_{12}O_3N_2 \cdot SO_4H_2 +$ $3\frac{1}{2}H_2O$.		Kurze vier- seitige Pris- men.		
	$(C_{15}H_{12}O_3N_2)_2 \cdot SO_4H_2 (?)$	(106 s. 110)			
	Dithionigsaurer Furfurin	(111)			
	$C_{15}H_{12}O_3N_2 \cdot PO_4H_3$.	(110)	Silber- glänzd. Blättchen.		
	$(C_{15}H_{12}O_3N_2)_2 \cdot PO_4H_3$.	(110)	Schief vier- seitg. Pris- men.		
	$(C_{15}H_{12}O_3N_2)_3 \cdot PO_4H_3$.	(110)	s. ob.		
	$(C_{15}H_{12}O_3N_2)_4 \cdot P_2O_7H_4$.	(110)			
	$C_{15}H_{12}O_3N_2 \cdot PO_3H$.	(110)			
	$(C_{15}H_{12}O_3N_2)_2 \cdot Cr_2O_7H_2$.	(106)	Orangegel- bes Pulver.		

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. w.	Farbenreaktion	Andere	
	k: sch. (106)						
	k: sch. (106)						
				l. in reinem, sch. in schwe- fels. hal- tigem Wss. (110. 106)			
				Schw.			
l.							
				Schw.			

No.	Name	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siedepunkt
	Essigsäures Furfurin $C_{15}H_{12}O_3N_2 \cdot C_2O_4H_2$.	(106)			
	Säures weinsäures Furfurin	(110)			
	Mellithsäures Furfurin	(112)			
118.	Fucusamid. $C_{15}H_{12}O_3N_2$.	Stark., wssg. Ammoniak auf Fucosol. ⁽⁴⁴⁾			
119.	Aethylfurfurin $C_{15}H_{11}(C_2H_5)O_3N_2$.	Silberoxyd auf das jodwasserstoffs. Salz. ⁽¹⁰⁶⁾	Syrup.		
	$C_{15}H_{11}(C_2H_5)O_3N_2H_3$.	Äthyljodid auf Furfurin (H.). ⁽¹⁰⁶⁾			
	$[C_{15}H_{11}(C_2H_5)O_3N_2 \cdot HCl]PtCl_4$.	(106)			
120.	Dimethylfurfurin (?)	(113)			
121.	Amylfurfurin $C_{15}H_{11}(C_5H_{11})O_3N_2$.	(106)			
	$C_{15}H_{11}(C_5H_{11})O_3N_2 \cdot HJ$.				
	$[C_{15}H_{11}(C_5H_{11})O_3N_2 \cdot HCl]_2PtCl_4$.				
122.	Nitrofurfurin $C_{15}H_{11}(NO)O_3N_2$.	Kaliumnitrit auf Furfurinsulfat. ⁽¹¹⁴⁾			
	$C_{30}H_{27}N_5O_{15}$.	Kaliumnitrit auf Furfurinsulfat.			

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. W.	Farbenreaktion	Andere	
k: sch.							
sch.	l.						
sch.	l.	l.				Verd. Kalilauge (H.): Fucusin, dem Furfurin sehr ähnlich.	
				Sch. Lös. trocknet beim Verdampfen gummi- artig ein. Sch.			
n.	l.	n.					

No.	N a m e	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siedepunkt
	$(C_{30}H_{27}N_5O_{15} \cdot HCl)_2$ $PtCl_4$.				
	Silberdoppelsalz.	Ammoniakalisch. Silbernitrat auf $C_{30}H_{27}O_{15}N_5$.	Körnig, lichtbeständig.		
123.	Acetylfurfurin $C_{15}H_{11}(C_2H_3O)O_3N_2$.	1. Essigs.anhydrid auf Furfurin (H.). ⁽⁵³⁾ 2. Acetylchlorid auf Furfurin. ⁽¹⁰³⁾	Alk.: flockige, kryst. Masse.	c. 250° (zer- setzt) (210° braun).	
124.	Benzoylfurfurin (?)	(103)			
125.	Hexabromacetylfurfurin $C_{15}H_{11}(C_2H_3O)O_3N_2Br_6$.	Brom auf Acetylfurfurin in Eisessiglös. ⁽⁵³⁾	Gelblich-weisses Pulver.		
126.	Carboxäthylfurfurin $C_{15}H_{11}(CO_2 \cdot C_2H_5)O_3N_2$.	Chlorkohlens.ester auf Furfurinlös. in absolutem Äth. ⁽¹⁰³⁾	Weisser kry. Ndschl. Alk.: harte glänz. Prismen.	124°	
127.	Furfurylamin $C_4H_3O \cdot CH_2 \cdot NH_2$.	1. Zinn u. Salzs. auf Pyroschleims.nitril. ^(115, 78) 2. Natriumamalgam auf Phenylfurfurazid u. Essigs. in alk. Lös. ⁽¹³⁰⁾	Flüssigkeit, ölig.	Farblos. (durch Licht u. Luft gelb) stark lichtbrechend.	145 bis 146° Wssd. flüchtig; 145° (130) (754mm) 80° (84mm)
	$C_5H_7NO \cdot HCl$.				
	$(C_5H_7NO)_2 PtCl_4$.				
	$C_5H_7NO \cdot C_2H_2O_4 + \frac{1}{2}H_2O$.	(130)		Farbl. Prismen. Glänz. orangegelbe, rhombische Blättchen. Wss.: glänz. Blättchen.	

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. w.	Farbenreaktion	Andere	
	n.	l.	l.	L. Eis- essig.		Sehr beständig. Natrium, salpetrige S. Alkyljodide reagieren nicht. ⁽⁵³⁾	
		l. (zer- setzt)		L. Eis- essig, von Wss. ge- fällt.			
	sch.	l.	n.				
Coni- in- artig.	Misch- bar in allen Ver- hält- nissen.				Konz. Salzs. im Übersch. K. gelb, H. dunkelgrün. — Bildet ein Hy- drochlorat (farb- los), erst bei län- gerem Kochen färbt sich gelb. (130)	Aus der Luft zieht es Kohlens. an u. bildet eine trockene Krystallmasse vom Schmelzp.-75; beim Erhitzen über den Schmelzp. spaltet es CO ₂ ab. ⁽¹³⁰⁾	Leichter als Wss. das Pi- krat bildet gelbe Prismen, die sich über 150° zer- setzen, (ohne zu schmelzen.) Das Sulfat krystallis. aus Alk. in kl. flachen Nadeln. ⁽¹³⁰⁾
	h: l.			L.			
	l.	sch.		Konz. Salzs.: sch.			

No.	N a m e	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siedepunkt
128.	Furfuräthenpyridin $C_4H_3O \cdot CH = CH \cdot C_5H_4N$.	Chlorzink auf Piccolin u. Furfurol (H.). ⁽¹⁴⁵⁾		Nadeln, an der Luft sich bräunend.	51 bis 53° Im Vacuum destillierbar.
129.	Furfuräthanpiperidin $C_4H_3O \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot C_5H_{10}N$.	Natrium u. Alk. auf Furfuräthanpyridin. ⁽¹⁴⁵⁾	Öl.		245 bis 247°
130.	Furfurchinolin $C_4H_3O \cdot C \equiv N$ $C_6H_4 \begin{smallmatrix} \diagup \\ \diagdown \end{smallmatrix} CH = CH$. Pikrat.	Erhitzen der Furfurchinonins. ⁽¹⁴⁴⁾	Alk.: lange, derbe Ndl. Alk.: grofse gelbe Blätt.	92° 186°	über 300°
131.	Phenylfurfuraldehydin $C_6H_4N_2(C_5H_4O)_2$. $C_6H_4N_2(C_5H_4O)_2HCl$. $[C_6H_4N_2(C_5H_4O)_2HCl]_2$ $PtCl_4$. $C_6H_4N_2(C_5H_4O)_2 \cdot NO_3H$. $C_6H_4N_2(C_5H_4O)_2SO_4H_2$. $C_6H_4N_2(C_5H_4O)_2 \cdot CH_3J$.	Kalilauge auf das salzs. Salz. ⁽¹¹⁶⁾ Furfurol auf salzs. Orthophenylendiamin. Überschüssig. verd. Salpeters. auf eine Lös. des salzs. Salzes. Jodmethyl auf Phenylfurfuraldehydin (H.). ^(100°)	Fast farbl. kompakte Krystalle. Krystallinisch. Alk.: gelbe Blättchen. Nadeln. Gelbliche Prismen.	95 bis 96° 192 bis 193°	

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. w.	Farbenreaktion	Andere	
Nach einiger Zeit piccolin- artig.	sch.	l.	l.				Hg salz ist gelber Ndsch., vom Schmelzpunkt 133°. Platinsalz sind rotgelbe Nadeln, Schmelz- punkt 155°. Pikrat gelbe Nadeln Schmelz- punkt 185—190°
Piperidin- artig.							Das HCl salz hat Schmelzp. 145—148°; das HIsalz 119— 121°; das HBr- salz 133—135°.
Zimmt- artig.	k: n.	l.	l.	Benzol etc. l.			S. a. Pt- u. Au- Doppelsalze u. Bichromat.
	sch.		sch.				
	n.	l.		Sch. Li- groin, leichter Benzol.			

No.	N a m e	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siedepunkt
132.	Amidophenylfuromethan $\text{CH}_2 \cdot \text{C}_6\text{H}_4\text{NH}_2 \cdot \text{C}_4\text{H}_3\text{O}.$	Anilin u. Anilinchlorhydrat auf Furfuralkohol (daneben entsteht eine kondensierte Verb. $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{O}_3$). ⁽⁹⁸⁾	Gelb.		
	$\text{C}_{11}\text{H}_{11}\text{NO} \cdot \text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{NH}_2 \cdot \text{HCl}.$		Grüne Kry.		
133.	α-Furfurcinchoninsäure $\begin{array}{c} \text{N} = \text{C} (\text{C}_4\text{H}_3\text{O}) \\ \text{C}_6\text{H}_4 < \begin{array}{c} \\ \text{C} = \text{CH} \\ \\ \text{CO}_2\text{H}. \end{array} \end{array}$	Anilin auf alkoh. Lös. von Furfurol u. Brenztraubens. (H.). ⁽¹⁴⁴⁾	Alk.: grün-gelbe Ndl.	210 bis 215°	
134.	Furfuracrylsäure (Furfuracrylglycocol) $\text{C}_9\text{H}_9\text{NO}_4.$	Entsteht im Organismus durch Furfurolfütterung oder bei subcutaner Injection von Furfuracryls. ⁽¹⁴⁶⁾		208° Bräunung 213 bis 215°	
135.	Toluylfurfuraldehydin $\text{C}_6\text{H}_3(\text{CH}_3)\text{N}_2(\text{C}_5\text{H}_4\text{O})_2.$	1. Kali auf das salzs. Salz. — 2. Orthotoluylendiamin auf Furfurol (H.) und Behandeln mit Kali. ⁽¹¹⁷⁾	Verd. Alk.: dünne, wsse. seideglzde Prismen.	115 bis 116°	
	$\text{C}_{17}\text{H}_{14}\text{O}_2\text{N}_2 \cdot \text{HCl}.$	Salzs. Orthotoluylendiamin auf Furfurol.	Weisse Körner.		
	$(\text{C}_{17}\text{H}_{14}\text{O}_2\text{N}_2 \cdot \text{HCl})_2 \text{PtCl}_4.$		Salzhalt. Alk.: gelbe Kryst.		
	$\text{C}_{17}\text{H}_{14}\text{O}_2\text{N}_2\text{HOH}.$	Verd. Salpeters. auf die Lös. des salzs. Salzes.	Nadeln.		
136.	Difurfur-m-Toluylen-diamin	Furfurol auf m-Toluylen-diaminlös. (H.). ⁽¹¹⁸⁾	Alk.: Kleine orangefarbene Ndl.		
	$\text{C}_7\text{H}_6\text{N}_2(\text{C}_5\text{H}_4\text{O})_2.$				
	$(\text{C}_{17}\text{H}_{18}\text{O}_4\text{N}_2\text{HCl})_2 \text{PtCl}_4.$		Krystallinisch.		

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. w.	Farbenreaktion	Andere	
zer- setzt rot.							
k: sch. h: l.	l.	l.	Benzol: l. In Alk. u. Säuren lösl.		Alk.-Lös. fluores- ciert blau.		In der Kälte entsteht aus Anilin, Furfurol u. Brenztrauben- säure $C_{20}H_{16}$ N_2O_2 . Die Ag-, Pb-, u. Cu-salze sind sch. lösl. s. a. Pt- u. Au- Doppelsalze.
sch.	l.	sch.				Beim Kochen mit Baryt- wss. entsteht Glycocoll u. Furfuracryls.	S. a. Agsalz.
	l.	l.	Schw: Ligroin; l: Benzol.				
					Verd. Salzs. löst tiefrot, viel Wss. entfärbt.		

No.	N a m e	Entstehung	Ansehen	Schmelzpunkt	Siedepunkt
137.	β-Furfuronaphtalin $C_{10}H_7N:CH.C_4H_3O.$ $C_{15}H_{11}NO.HCl.$ $C_{15}H_{11}NO.H_2O.$	β -Naphtylamin auf Furfurol. ^(98 s. a. 118)	Glzd. Blättchen od. farbl. Ndl. Alk.: gelbe Nadeln. Flüssigk. rot.	85°	
138.	Oxyfurfuranilin $C_6H_4(OH)N:C_5H_4O.$ Salzsaures Salz.	p-Amidophenol auf Furfurol in verd. wssg. Lös. ⁽¹¹⁸⁾ Weingeistig. Salmiaklös. auf Oxyfurfuranilin u. Salzs.	Kleine, hellgelbe Prismen. Cantharidenglänz. krystallinisch.	180 bis 182° (zerstzt)	
139.	Pyroschleimsäureanilid $C_4H_3O.CONH.C_6H_5.$	Anilin auf pyroschleims. Anilin.	Alk.: silberglänz. Blätter od. Nadeln; Benzol: kurze Prismen.	123,5°	
140.	Furfurenylamidophenantrol $C_4H_3O.C \begin{cases} O-C-C_6H_4 \\ \parallel \\ N-C-C_6H_4 \end{cases}$	Phenanthrenchinon u. wssg. Ammoniak auf Furfurol. (H). ⁽¹¹⁹⁾	Amylalk.: farblose, seidenglänz. Nadeln.	231°	unzerstzt sublimierbar
141.	Difurfurbenzidin $C_{22}H_{16}O_2N_2.$ $C_{22}H_{20}O_4N_2.2HCl.$	Benzidin auf Furfurol in alk. Lös. ⁽¹¹⁸⁾	Kleine, hellgelbe Ndl. Kupferglzd. Blättchen.		
142.	Furfuramidobenzoësäure $C_6H_4(NH_2)CO_2H+C_5H_4O_2.$ Ester.	1. m-Amidobenzoës. auf Furfurol. — 2. Furfurol auf wssg. Lös. d. m-Amidobenzoës. ⁽¹¹⁸⁾ m-Amidobenzoësäure-ester auf Furfurol.	1. Tiefrote Masse; 2. kleine dichroitische Nadeln. Hellgelb.		

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. W.	Farbenreaktion	Andere	
	n.	sch.				Beim Schmelzen d. Base od. d. Salzes rötliche, blau fluorescier. Verb. Lösl. Wss.	
		l.					
		l.			Salzs. färbt alk. Lös. tiefer gelb. Salmiak beim Verdunsten fuchsinrot.		
	sch.	l.					
	h: sch.						
		sch.		L. h. Benzol.	Schwefels. (K.): rötlich braune, blaufluoreszierende Lösung.		
	n.	k: sch. h: l.		L. Benzol.			Salze sind tief karmoisinrot, sehr lichtempfindlich.
		l.		Sch: salzs. haltig. Wss. Lösl. Alkalicarbonaten.	Alk.-Lös. fuchsinrot mit Salzs.	Mit Säuren keine Salze.	Amidocumins. u. die Amidosalicyls. geben analog gefärbte Verb.: kl. rote Nadeln. ⁽¹¹⁸⁾
					Säuren: violettrot.		

No.	N a m e	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siede-
143.	Furfuranilin $C_{17}H_{18}O_2N_2$.	Furfurol in alk. Lös. auf Anilin u. salzs. Anilin in alk. Lös. (H.) u. Ammoniak auf das so erhaltene salzs. Salz. ^(118, 51)	Hellbraun amorph.		
	$C_{17}H_{18}O_2N_2HCl$.	(s. ob.)	Kl. purpur- rote Nadeln.		
	$C_{17}H_{18}O_2N_2NO_3H$.	(Analog oben.)	Purpurrote Kryst.		
		Zusatz: Analoge Verb. entstehen aus: 1. m-Nitranilin, o- u. p-Toluidin, Xylidin, Cumidin, p-Amidophenol, Anisidin, α u. β -Naph- tylamin; 2., Methyl- Äthylanilin, Äthylortho- toluidin, Diphenylamin; 3. Phenylen-, Toluylen- diamin, Benzidin, Harn- stoff, Äthylharnstoff; 4. Triamidophenolchlor- hydrat; 5. m-Amidoben- zoës., Amidocumins., Amidosalicyls., Sulfanils., Naphions., β -Amido- phtals.äther, Amidoben- zoëäther, Amidobenz- amid. ^(s. 98)			
144.	Phenylfurfurazid $C_6H_5NH.N:CH.C_4H_3O$.	Phenylhydrazin auf Furfurol.	Gelbliche Blättchen.	96°	
145.	Pyroschleimsäureamidä- thylaminid $C_4H_3O.C \begin{cases} N.C_2H_5 \\ NH.C_2H_5 \end{cases}$.	Phosphorpentachlorid auf pyroschleims. Äthyl- amin (H.). ⁽⁷⁵⁾	Flüssig- keit.		
146.	Furfurhydrazin $C_4H_4O.CH:(NC_6H_5)_2$.	Furfurol auf Hydrazo- benzol. (H.). ⁽¹²⁰⁾	Nadeln.	59°	

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. w.	Farbenreaktion	Andere	
	n.	l. an der Luft zer- setzt	l.				
	n.			N: Ben- zol, Schwefel- kohlen- stoff.		Verd. Säuren od. Alkalien (H) zersetzen.	Dem vorigen ähnlich.
							Platindoppelsalz krystallisiert in Blättchen.

No.	N a m e	Entstehung	Aussehen	Schmelzpunkt	Siede-
147.	Monomethylfurfuranilin-chlorhydrat $C_5H_4O_2C_6H_7N \cdot C_6H_6$ $CH_3N \cdot HCl.$	Methylanilin auf Furfurol u. Anilinchlorhydrat resp. Anilin auf Furfurol u. Methylanilin-chlorhydrat. ⁽⁹⁸⁾	Grünliche, warzenförmige, resp. violette Kr.		
148.	Furfurtoluidin $C_{19}H_{22}O_2N_2.$ $C_{19}H_{22}O_2N_2 \cdot HCl.$ $C_{19}H_{22}O_2N_2 \cdot NO_5H.$	Ammoniak auf das salzs. Salz. ⁽⁵¹⁾ Furfurol in alk. Lös. auf p-Toluidin u. salzs. p-Toluidin (H).	Braune, amorphspröde Masse. Purpurrote Nadeln. Desgl.		
149.	Dimethylfurfuranilin-chlorhydrat $C_5H_4O_2 \cdot 2C_6H_5CH_3$ $NHCl.$	Alk. Salzs. auf Methylanilin u. Furfurol in alk. Lös. ⁽⁹⁸⁾	Alk.: violette Kr.	94°	
150.	Furfurdiphenylamin $C_{29}H_{26}O_2N_2.$ $C_{29}H_{26}O_2N_2 \cdot HCl.$	Diphenylamin auf Furfurol (H). ⁽¹¹⁸⁾ 1. Salzs. auf die Base. — 2. Salzs. Diphenylamin auf Furfurol (H).	Öl, braun. 0° grüne Krystallmasse. Bronzefarbene Krystalle		
151.	Furfurnitranilin $C_6H_4(NO_2)NH_2 + C_5H_4O_2.$ $C_{11}H_{10}N_2O_4 \cdot HCl.$	Furfurol auf m-Nitroanilin in weingeistig. Lös. ⁽¹¹⁸⁾ Verd. Salzs. auf die Base in alk. Lös.	Chromgelbe Krusten. Kupferglzd. Blättchen.	100 bis 120° (zer- setzt)	
152.	Anilinfurobenzamat $C_5H_4O_2 < \begin{matrix} C_6H_5NH_2 \\ C_6H_4 < CO_2H \\ NH_2. \end{matrix}$	Furfurol auf Anilinbenzamat in wssg. Lös. ⁽⁹⁸⁾	Fuchsinartig. Masse u. rotgrüne Blättchen.	zer- setzt sich, ohne zu schmel- zen.	

Geruch	Löslichkeit in				Reaktionen		Bemerkungen
	Wasser	Alkohol	Äther	u. s. W.	Farbenreaktion	Andere	
	sch.	l. fuchsinrot.	sch.			Konz. Säuren zersetzen.	
	l. rot.	sch.					Äthylanilin u. Äthyltoluidin reagieren analog Dimethylanilin nicht.
		l. tiefrot.					
		tief rot.				Überschüssige Säure zersetzt unter Entfärbg.	Lös. der Salze tiefrot.
		l. (n. kristallisiert)				Zersetzt sich beim Kochen mit Wss.	Analog reagieren die Benzamide des Amido-benzamid u. des β -Naphthylamin.

Druck von Leonhard Simion, Berlin SW.
